

Barnundersökning på BB

I normalfallet undersöks nyfödda en gång. Bedömer man att ytterligare undersökningar är indicerade ordinerar detta muntligt till barnmorska och skriftligt i Cambio Cosmic.

Undersökningen bör utföras när barnet är 12-48 tim gammalt. Barnmorska eller barnundersköterska deltar. Förutom klinisk undersökning ska POX screening vara gjord (mellan 6-24 timmars ålder) samt signeras av barnläkare.

Det är viktigt med kommunikation mellan barnläkare och barnmorska om avvikelse i graviditeten och förlossning. Detta gäller både muntlig information samt anteckningar i mammas journal i ÖD Mödravård (översikt dokument) som barnläkare kan ta del av.

Notera särskilt:

- Morfinpreparat i samband med förlossning?
- Långvarig vattenavgång/given antibiotika (vilket preparat och när), mekoniumfärgat fostervatten?
- Mammans sjukhistoria och medicinering (t.ex. tuberkulos, HIV, hepatit etc.)
- Blodgruppering framför allt immunisering eller Rh negativitet?
- Diabetes hos mamma?
- Annan värdefull belastande anamnes hos mamman, t.ex. socialt och hereditet?
- TRAK – tyroidea receptor antikroppar (kollas i ”svar provbunden” - mikrobiologi)?
- Ultraljud fynd (njuror, missbildningar)?
- Genomförd fosterdiagnostik?

Barn som undersöks tidigare än 12 h post partum bör undersökas en andra gång, förslagsvis i samband med PKU provtagning. Om PKU-provtagning infaller på en lördag/söndag är det önskvärt att BB-personalen reserverar tid för undersökning i samband med alla andra planerade BB undersökningar. Detta för att undvika hög belastning på jourhavande barnläkare.

Var god se även PM för tidig hemgång.

[Säker vård efter förlossningen 2013](#) – länk

https://www.sfog.se/media/154226/s_ker_v_rd_efter_f_rlossningen_2013.pdf