

Hudöverskott efter fetmakirurgi – villkor

Information för remitterande läkare och patienter

Gäller för: Kirurgkliniken Växjö

Vi opererar enbart viss *omfattande* hudöverskottsproblematik med klara *funktionella besvär*, huvudsakligen på buken. Då görs bukplastikkirurgi när hudöverskottet avlägsnas på magen och eventuellt i kontinuitet något utåt mot flankerna.

Korrektioner av bysten utförs i enlighet med riktlinjer för tung byst eller asymmetri. Enbart hängande byst opereras inte inom ramen för offentlig rekonstruktiv plastikkirurgi. Hudöverskott på armarna och låren tar vi i regel inte hand om.

För att patienter skall övervägas för kirurgi inom ramen för vår verksamhet finns villkor som man ska uppfylla. *Viktnedgång* kan nämligen, pågå i vissa fall även det andra postoperativa året. I andra fall kan *viktuppgång* börja det andra året efter kirurgi. De flesta opererade patienter stabiliserar sin vikt efter det andra året. Av de skälen finns följande **villkor**:

- Man ska inte vara rökare
- BMI ligger under 28
- Hudöverskottet ska överstiga fem centimeter mätt på buken från veckets övre del i avslappnat tillstånd till den lägsta punkten.
- Vikten ska ha legat stabilt och under BMI < 28, under ett års tid
- BMI upp till 30 och eller mindre hudveck accepteras i enstaka fall med extrem initial vikt och viktnedgång. Samma gäller om det finns svårt behandlat hud eksem, irritation eller svampproblem
- Man ska vänta ett år efter den sista graviditeten innan man kan räkna med att bli bedömd.

Kirurgi av detta slag innebär *stor risk för postoperativa komplikationer* beroende både på stora sårtytor, lång operationstid, och den genomgångna fetmaoperationen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare