

Riktlinje

Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård

Område: Höft och bäcken

Giltig fr.o.m: 2018-08-15

Giltig t.o.m: 2020-01-09

Faktaägare: Gustav Kalin, Specialistläkare/ortopedkliniken

Fastställd av: Jonas Johansson, Verksamhetschef/ortopedkliniken

Revisions nr: 1

Identifierare: 107136



Höftfraktur och nya perorala antikoagulantia

Gäller för: Ortopedkliniken Ljungby

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Operation vid höftfraktur och nya perorala antikoagulantia..... | 2 |
| 1.1 | Eliquis®, Lixiana®, Xarelto® | 2 |
| 1.2 | Pradaxa® | 2 |
| 2 | Riktlinjer | 2 |
| 3 | Cyklokapron..... | 2 |
| 4 | Trombocythämmare | 2 |
| 5 | Confidex | 2 |
| 6 | Akut operation..... | 2 |

1 Operation vid höftfraktur och nya perorala antikoagulantia

Eliquis® (Apixaban), Lixiana® (Edoxaban), Pradaxa® (Dabigatran), Xarelto® (Rivaroxaban)

1.1 Eliquis®, Lixiana®, Xarelto®

- Normal njurfunktion: Operation tidigast 24h efter senaste tablett.
- Nedsatt njurfunktion (kreatininclearance, eGFR<30): Operation tidigast 48timmar efter senaste tablett.

1.2 Pradaxa®

- Antidot för akut reversering av Pradaxa: **Praxbind®** 5mg intravenöst. Ges på Operationssalen.

2 Riktlinjer

Patienterna sövs. Om patienten skall opereras i spinalanestesi gäller riktlinjerna från SFAI och SSTH, det vill säga 2 dagar vid normal njurfunktion och 3 dagar vid GFR 15-30 från senaste NOAK intag.

3 Cyklokapron

Alla får **Cyklokapron** 1gram intravenöst. Ges på operationssalen.

4 Trombocythämmare

Står patienten på trombocythämmare ges **Octostim** 0,3 µg/kg kroppsvikt. Ges på operationssalen. Maximal effekt efter 60 minuter. (Enda kontraindikationen är Von Willebrands sjukdom typ 2B). Står patienten på två olika trombocythämmare tas kontakt medicinbakjour då det ofta finns en väl grundad anledning till varför.

5 Confidex

Confidex reserveras för användning vid livshotande blödning. Trombocyter finns i Växjö och kan beställas med taxi.

6 Akut operation

Om man absolut önskar operera patienten akut, skrivs en akut medicinkonsult för bedömning av risken att snabbt reversera antikoagulationen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare