

Tourniquet - åtgärder på sjukhus

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Anders Lindgaard Andersen, överläkare anestesikliniken Växjö

Avsnörande förband, Combat Application Tourniquet C-A-T, ingår idag i ambulansens utrustning. Tourniquet finns också med i militärens och polisens utrustning.

Indikationer inom ambulansverksamheten

- blödning som ej kan kontrolleras med tryckförband.
- vid livshotande blödning för att lösa A- och B-problem.

Tourniqueten sätts så distalt som möjligt på överarm eller underben som möjligt och lämnas synlig.

Åtgärder på sjukhus

- Läkare bör om möjligt vara närvarande när patienten anländer till akutmottagningen eller möta upp snarast.
- Tidpunkten då den är anlagd finns noterad i tidsfältet på tourniqueten
Tourniqueten bör avlägnas inom två timmar förutsatt att patienten är stabil p.g.a. risken för permanenta nerv- och muskelskador.
- En korrekt anlagd tourniquet är smärtsam, varför smärtlindring kan behövas för att patienten skall tolerera tourniqueten.
- Tourniqueten lämnas synlig.
- På sjukhuset tas tourniqueten av efter beslut av läkare.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare