

Axelluxation sluten

Gäller för: Anestesikliniken Växjö

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Skribenter: Anette Jonasson, Ingrid Wilhelmsson, Emma Frejd, Fredrik Kullberg, Marie Bomberhult, Jenny Backe, Eva Hagelberg, Anette Asthede Rydström

1 Innehållsförteckning

2	Indikation	1
3	Preoperativa förberedelser.....	1
3.1	Patient:.....	1
3.2	Anestesi:.....	2
3.3	Operation.....	2
4	Särskilda observanda.....	2
4.1	Operationsgång.....	2
5	Position.....	2
6	Utrustning	2
7	Hygien.....	2
8	Elimination.....	3
9	Anestesi.....	3
10	Peroperativ vård	3
11	Postop	3
11.1	Postoperativa hjälpmedel	3

2 Indikation

I de flesta fallen är axeln luxerad framåt och nedåt. Oftast reponeras axlen på akutmottagningen utan narkos.

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi.
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)

- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering till barn anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)- Lokala riktlinjer.
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#) - Operatör ska sidomarkera aktuell kroppsdel före anestesistart.

3.2 Anestesi:

- [Barnanestesi Region Kronoberg](#)- Lokala riktlinjer.
- [Blodgruppering/bastest ortopedkliniken](#).
- Blodgruppering: Nej.
- Bastest: Nej.

3.3 Operation

- Eventuellt vill operatören ha ett mothåll i armhålan.

4 Särskilda observanda

4.1 Operationsgång

Operatören drar axelleden på plats.

5 Position

Repornering görs i säng eller på operationsbord.

6 Utrustning

- C-båge – strålskyddskläder till personalen.

7 Hygien

- Mössa.
- [Arbetskläder](#)- lokala anvisningar.
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning](#) – Vårdhandboken.

8 Elimination

- Bladderscan före anestesistart och efter avslutad operation enligt riktlinjer. Vid behov urintappning av patienten efter bladderscan eller sätts kortids-KAD på patienten enligt ordination av anestesiläkare.
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation-vuxna patienter](#) – lokala anvisningar.

9 Anestesi

Mask/näsgrimma, O2/luft/Propofol/Rapifen.

Ingreppet utförs i patientens säng eller på operationsbordet. Operatör ska vara på plats vid sövning.

10 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken

11 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

11.1 Postoperativa hjälpmedel

Eventuell slynga.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare