

Amnioinfusion

Faktaägare:

Vid oligohydramnios och/eller variabla decelerationer kan amnioinfusion göras i syfte att minska kejsarsnittsfrekvensen. Det har också visats i studier att risken för mekoniumaspiration minskar med amnioinfusion.

Indikation:

- Oligohydramnios
- Variabla decelerationer
- Kraftigt mekoniumfärgat fostervatten

Kontraindikationer:

- Misstänkt fosterasfyxi
- Amnionit
- Blödning/misstanke om ablatio
- Preeklampsi (risk för lungödem)
- Sätessändläge
- Flerbörd
- Känd systemsjukdom

Metod:

Amnioinfusion förutsätter att man har en fungerande IUP-kateter anlagd. Via denna infunderas 500 ml kroppsvarm 0,9% NaCl lösning i relativ snabb takt (rumstempererad går också bra). Därefter ges kontinuerlig infusion i långsam takt för att ersätta den volym som rinner ut. Kontrollera eventuellt med ultraljud att fostervattenmängden i uterus ökat.

Försiktighetsåtgärder:

- Avstå amnioinfusion om det varit svårigheter att lägga in IUP-katetern.
- Avbryt infusionen om plötsligt spontant värkarbete eller snabb progress av förlossningen.
- Var särskilt noggrann med monitorering av det intrauterina trycket vid samtidig smärtlindring med EDA
- Infusionen ska inte ges via infusionspump

Giltig fr.o.m: 2018-02-28

Giltig t.o.m: 2020-02-15

Identifierare: 110178

Amnioinfusion



- Kontrollera att det rinner ut vätska från vagina under pågående infusion. Det har rapporterats komplikationer i form av fostervattenemboli i storleksordning 5-10 /100000 fall. Man bör därför respektera ovan nämnda försiktighetsåtgärder.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare