

## Checklista för behandling med Prolia

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Faktaägare:** Daniel Albertsson, distriktsläkare vårdcentralen Moheda  
Snjezana Barbir, överläkare akutgeriatriska kliniken

**Personnummer** \_\_\_\_\_

**Namn** \_\_\_\_\_

**Övrigt** \_\_\_\_\_

**Ordinationsdatum** \_\_\_\_\_ **Läkare** \_\_\_\_\_

- Pågår eller planeras invasiv tandvård?                      Ja                      Nej
- Allergier?    Ja                      Nej
- Kalk- och D-vitaminbehandling
- Provtagning 1-2 veckor före planerad behandling (S-kalciumjon och P-kreatinin)
- Absolut GFR > 20 ml/min. Risken för hypokalcemi är högre vid GFR <30 ml/min
- Normalt värde S-kalciumjon
- Provtagning även 1 vecka efter behandling (S-kalciumjon och P-kreatinin)
- Kallelse och [patientinformation](#) skickad till patienten
- Prolia injektionsvätska 60 mg rekvideras i beställningsmall för läkemedel

- Behandlingsdatum \_\_\_\_\_
- Patienten är utrustad med telefonnummer till sjuksköterska/mottagning
- Nästa behandling \_\_\_\_\_

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela  
faktaägare**