

Ventrikel - Magsäcksundersökning vuxna

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenenheten Ljungby, Röntgenenheten Växjö

Faktaägare 2: Sofia Cegrell Jonsson, sektionsansvarig läkare gastro

Metod

Gastroskopi är förstahandsmetod vid bedömning av ventrikeln. Röntgen utförs när gastroskopi inte är genomförbart.

Magsäcksröntgen **utförs normalt med sond** (via näsan) till magsäcken. I denna tillförs bariumkontrast och luft vilka är de kontrastmedel som används. Om sondnedläggning inte är möjligt kan den luft som normalt nedblåses genom sonden ersättas av ett pulver som bildar kolsyra/koldioxid i magsäcken.

Ibland får pat en intravenös injektion med **Buscopan** för att magsäcken skall vara stillastående.

Indikation

Bedömning av ventrikeln när gastroskopi inte är genomförbart.

Kontraindikation

Remissinformation

Patientförberedelser

Patienten skall vara fastande från kl 24.00. Han skall inte heller röka, snusa eller tugga tuggummi.

Eftervård

Dricka lite extra efter undersökningen samma dag och dagen efter.

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

Dokumentförteckning

Antal exemplar	Dokumentets placering
1	Elektroniskt Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia
1	Kopia

Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring