

Tunntarmsundersökning - vuxen

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenenheten Ljungby, Röntgenenheten Växjö

Faktaägare 2: Sofia Jonsson, sektionsansvarig läkare gastro

Metod

Konventionell tunntarmsröntgen har ersatts av mer moderna metoder och utförs nu endast i undantagsfall. MR tunntarm är förstahandsmetod vid misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom. Hos äldre patienter och vid misstanke om tumör i tunntarmen kan CT tunntarm utföras. Vid misstänkt blödning från tunntarmen utförs i första hand kapselendoskopi.

Om konventionell tunntarmsröntgen trots allt bedöms indicerat utförs detta vanligen med sond via näsan. Under kontrollerade former ges cirka 1-1,5 liter kontrast som behövs för att avbilda tunntarmen i sin helhet.

Indikation

Konventionell tunntarmsröntgen utförs endast i undantagsfall då MR eller CT av någon anledning inte har kunnat ge tillräcklig information.

Kontraindikation

Remissinformation

Varför MRT/CT inte är tillfylles. Operationshistorik.

Patientförberedelser

Patienten ska vara fastande från kl 24:00 kvällen före undersökningen. (Det går bra att dricka vatten.) I vissa fall krävs laxering inför undersökningen. Instruktioner om sådan meddelas i så fall av röntgenavdelningen.

Eftervård

Extra dricka efter undersökningen samma dag och dagen efter. Äta och vara som vanligt

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

Dokumentförteckning

Antal exemplar	Dokumentets placering
1	Elektroniskt Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia

1	Kopia	
---	-------	--

Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring