

Colon-stomiopererade vuxen

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenenheten Ljungby, Röntgenenheten Växjö

Faktaägare 2: Sofia Cegrell Jonsson, sektionsansvarig läkare gastro

Metod

Det är numera endast stomiopererade patienter som undersöks med konventionell tjocktarmsröntgen.

Tjocktarmsröntgen syftar till att avbilda tjocktarmen, görs genom att tarmen fylls med kontrast och därefter avbildas.

Indikation

Kontraindikation

Remissinformation

Patientförberedelser

Patienter med kolostomi förbereds med fullständig laxering.

Patienter med "dubbelpipig" kolostomi: Om endast nedre segmentet skall undersökas så förbereds patienterna som de med ileostomi.

Om båda segmenten skall undersökas så förbereds patienterna med laxering samt med vattenlavemang via rektum.

Patienter opererade enligt Hartmann skall förberedas som kolostomipatienter.

Patienter med ileostomi som skall undersöka tjocktarmen skall inte laxera. De behöver inte heller följa dietföreskrifterna men får ett vanligt vattenlavemang via rektum.

Vid tveksamhet när det gäller stomiopererade, kontakta gärna stomiterapeuten.

För att undersökningen ska bli bedömbär måste tarmen vara fri från tarminnehåll.

Ett laxeringschema kommer skickas med kallelsen inför undersökningen.

Eftervård

Efter undersökningen kan du äta som vanligt.

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring