

Åtgärder vid långvarig operation (OPC Ane LL)

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Ljungby

Faktaägare: Jan-Erik Stenmyr, Anders Dynebrink

Med långvarig operation menas en beräknad "knivtid" på mer än två timmar.

Sambandet mellan långa operationstider och ökat antal komplikationer är klart belagd. Den långa operationen medför ökad risk för nerkylning, volymförlust, tryckskador m.m.

Ett antal åtgärder kan minska riskerna:

1. Klä på patienten efter nersövningen för att isolera. Använd benholkar, mössa etc.
2. Använd Bair-hugger från nersövning tills det är klart att köra ut patienten.
3. Värm upp infusionsvätskor med vätskevärmare.
4. Följ temperaturen kontinuerligt.
5. Mät timdiures. Vid en lång operation utan KAD t.ex. tandnarkos används Bladder Scan.
6. Kontrollera med jämna mellanrum och efter förmåga uppläggnings generellt sett. Förebygg tryck och översträckning som kan uppkomma under operationens gång. Före nersövningen kan man fråga patienten om det finns några problem från t.ex. höfter eller axlar.
7. Om benstöd används under en långvarig operation skall benen planas med jämna mellanrum. Förslagsvis var annan timme.
8. Se till att operationssalen har en bra temperatur.
9. Värm upp patientsängen inför operationens slut.

Giltig fr.o.m: 2018-04-18
Giltig t.o.m: 2020-04-12
Identifierare: 115995
Åtgärder vid långvarig operation (OPC Ane LL)



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare