

Blodgruppering och bastest (Ane LL)

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Anestesikliniken Ljungby

Faktaägare: Anders Dynebrink, MLA Ljungby Anestesikliniken

1 RIKTLINJER FÖR BLODGRUPPERING OCH BAS-TEST INFÖR KIRURGI

Undantag kan göras t ex för patienter med anemi eller på grund av det planerade ingreppets natur. Beslut om detta fattas av ansvarig operatör.

OBS! Att i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar skall prov för blodgruppering och prov för korstest/BAS-test tas vid skilda tillfällen. Inför planerade operationer beställs blodgruppering lämpligen i samband med mottagningsbesöket.

1.1 Blodgruppering:

Elektiva pat: Sträva efter att ta röret vid mottagningsbesöket. Blodgrupperingar utförs rutinmässigt f n endast mån-ons-fre om provet är på Blodcentralen före kl 09. Överväg akutsvar övriga tider.

Akuta pat: Be alltid om akutsvar!

Om antikroppar konstateras tar det i praktiken minst 5-6 timmar att få fram blod.

Akut blodgruppering utförs endast om BAS-test beställs samtidigt.

1.2 BAS-test:

Vid elektiv kirurgi skall remisser för och blodprov vara Blodcentralen tillhanda senast kl 14.00 vardagen före operationsdagen och vid akuta ingrepp så snart som möjligt.

1.3 ALLMÄNKIRURGISKA OCH UROLOGISKA PATIENTER

Var god se riktlinje "Preoperativ provtagning/undersökning, rutin inför kirurgi, Vård-PM".

1.4 ORTOPEDISKA PATIENTER

Blodgruppering och BAS-test beställs alltid vid följande ingrepp:

Axelprotes	Höftprotes
Dekompressionsop/rygg.	Knäprotes
Diskbräck	Laminektomi
Extirpation av benbildning i höft	Märgspikning
Femurfraktur	

Minst blodgruppering beställs vid följande ingrepp:

Tibiaosteotomi	
----------------	--

Riktlinjer i samråd med: Dan Linvik,
Ortopedkliniken

1.5 GYNEKOLOGISKA PATIENTER

Blodgruppering och BAS-test beställs alltid vid följande ingrepp:

Diagnostisk laparoskopi	Laparoskopiska ingrepp utöver nedanstående
Extrauterin graviditetet "X"	Prolapsplastik (om ej enl nedan)
Hysterectomi - vaginal, abdominell	Vaccumexaeres "VE"
Konisering	
Laparotomi	

Minst blodgruppering beställes vid följande ingrepp:

Prolapsplastik (om säkert endast främre kolporafi)	TVT
--	-----

Ingen blodgruppering behövs rutinmässigt vid följande ingrepp:

Abrasio	Hysteroskopi
Bartholincysta	Px portio

Riktlinjer i samråd med : Anne Nygaard Kvinnokliniken.

1.6 ÖNH-PATIENTER

Barn < ca 10 år tas Hb och blodgruppering på op då patienten är sövd.

Barn > ca 10 år tas blodgruppering vid mottagningsbesöket.

Blodgruppering beställes alltid vid följande ingrepp:

Tonsillectomi	Abrasio på vuxna och barn > 16 år
Tonsillotomi	

Ingen blodgruppering behövs rutinmässigt vid följande ingrepp:

Abrasio på barn <16 år	Septumplastik
Conchectomi	

Riktlinjer i samråd med: Carl-Arne Bertilsson, ÖNH-kliniken.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.