

## Shuntöversikt

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Utförs på:** Röntgenenheten Ljungby, Röntgenenheten Växjö

**Faktaägare 2:** Pia Petersson, sektionsansvarig läkare barn

### Metod

Vid misstanke på dålig shuntfunktion tas bilder rakt framifrån på alla delar av shunten. Där det finns kopplingsställen ska också bild från sidan tas. Vid behov tas också en separat bild av shuntventilen.

Vid misstanke på bristande shuntfunktion ska datortomografi av hjärnan också utföras. Om det finns misstanke på dåligt avflöde från slangen i magen kan detta bedömas med ultraljud (efter det att slangens ände har lokaliserats med röntgenbilder).

För att bedöma om slangen börjar bli för kort tas bild framifrån och från sidan, vanligen endast av buken.

### Indikation

Utförs för att bedöma om det finns något avbrott på en inlagd shuntslang eller om slangen har blivit för kort.

### Kontraindikation

### Remissinformation

### Patientförberedelser

Inga förberedelser.

### Eftervård

### Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

### Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	

1	Kopia	
---	-------	--

## Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring