

Injektion Cordarone® vid behandling av hjärtstopp

Gäller för: Region Kronoberg

Målgrupp: Gäller för de A-HLR utbildade sjuksköterskor med delegering att ge Cordarone®. Rekommenderas även för läkare som ordinerar läkemedel i samband med A-HLR. OBS! Gäller enbart till vuxna. Fortsatt spädning till barn.

Syfte: I de riktlinjerna för A-HLR rekommenderas att amiodaron (Cordarone®) skall ges utspätt. Detta då det saknas stöd för utspätt amiodaron i FASS då det i nuläget saknas en samlad dokumentation av biverkningar för denna beredningsform. HLR-rådet ser dock fördelarna med att ge amiodaron utspätt i det att administreringen blir mer lätthanterligt och att tid sparas. Denna åsikt har också framförts av motsvarande grupper i både Norge och Finland.

Riktlinje: Amiodaron (Cordarone®) ges i form av utspädd bolusdos följt av flushdropp om minst 200 ml Ringeracetat i samband med behandling av ventrikelflimmer/pulslös ventrikeltakykardi i enlighet med algoritm A-HLR. Vid intraosseös administration skall flushdroppet ges under övertryck.

Eventuella biverkningar av utspädd givet amiodaron skall anmälas till läkemedelsverket

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare