

## Traumapatienter på akutmottagningen

**Gäller för:** Region Kronoberg

Denna riktlinje gäller enbart patienter utsatta för trauma som **inte** uppfyller kriterierna för traumalarm. (då gäller riktlinjer för rött respektive orange traumalarm)

I följande situationer **skall** patienten undersökas av en **kirurgläkare**:

Patient som:

- Varit inblandad i olycka som föranlett traumalarm (men själv inte uppfyller larmkriterier)
- Varit avsvimmad
- Har trauma mot huvudet
- Är cirkulatoriskt påverkad
- Har buksmärter
- Har thoraxmärter
- Är andningspåverkad
- Fått kraftigt slag mot thorax eller buk
- Har djupa sårskador förutom i extremiteter

I följande fall **kan** patienten primärt undersökas av **ortopedläkare**:

Patient som:

- Har isolerad smärta i kotpelaren
- Har isolerad smärta i extremitet med påverkat distalstatus eller felställning
- Har djupa sårskador, utan kärlskada, i extremitet

I övriga fall kan man hänvisa till primärvård eller organspecifik specialitet.

Patienter som utsatts för trauma primärt **skall** bedömas som traumapatient enligt ovanstående. Vid misstanke om somatisk bakomliggande orsak till olyckan konsulteras eller remitteras berörd klinik för bedömning efter bedömning av traumatiska skador.

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**