

## Ultraljudsundersökning pleuradränage

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Utförs på:** Röntgenenheten Ljungby, Röntgenenheten Växjö

**Faktaägare 2:** Peter Kidron , sektionsansvarig läkare thorax

### Metod

Undersökningen görs sittande och tar ca 40 minuter (ingreppet 10 minuter).  
Utförs av läkare. Kontaktgel används.  
Aktuellt område tvättas med klorhexidinsprit och ”kläs in” med sterila dukar.  
Punktionsstället lokalbedövas med xylocain. Dränage anläggs med one-step teknik och vätska leds ut via drän till en påkopplad påse.

### Indikation

Dränage av pleuravätska

### Kontraindikation

Antikogulationsbehandling

<http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=36650>

### Remissinformation

Klinisk information av remittent.  
Eventuell antikogulationsbehandling.

### Patientförberedelser

Inneliggande.  
Fungerande pvc eller picc-line, subcutan venport.  
Blödningsprover PK, APTT, TPK och blodgruppering.  
Premedicinering ges av avdelningen.  
Eventuella prover tar avdelningen från dränet.

### Eftervård

Sängläge 4 timmar

### Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

### Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina

1	Kopia	
1	Kopia	

## Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring