

Rutin**Process:** 3 RGK Hälsa, vård och tandvård**Område:** Läkemedel**Giltig fr.o.m:** 2018-05-01**Giltig t.o.m:** 2020-04-26**Faktaägare:** Monika Renkielska, Överläkare Barn- och Ungdomskliniken**Fastställd av:** Anna Bårtås, Verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken**Revisions nr:** 1**Identifierare:** 117696

Ultiva

Gäller för: Barn- och ungdomskliniken

Preparat	Ultiva 1 mg
Spädning	Spädes i två steg Steg 1. Slamma upp Ultiva 1 mg med 1 ml NaCl 9 mg/ml. Dra denna ml NaCl-lösning från en påse med 100 ml. Nu är lösningen 1 mg/ml. Steg 2. Spruta tillbaka den blandade Utiva-lösningen i den ursprungliga 100 ml NaCl-påsen.
Koncentrationen blir	0,01 mg/ml
Dosering	Intavenös injektion- 0,1 ml/kg, ges under minst 1 minut Infusion- 0,01-0,05 ml/kg/minut
Administrationssätt	Intavenös injektion eller infusion
Observandum	Får inte ges i samma infart som blod eller plasma
Hållbarhet	Färdigberedd lösning hållbar i 12 timmar

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare