

Prednisolon®, patientinformation

Förväntad effekt av Prednisolon®

Prednisolon® - ett kortisonpreparat - har en kraftig inflammationsdämpande verkan och påverkar även immunförsvaret.

Förbättring med minskad stelhet, värk, ledsvullnad och trötthet kommer snabbt, som regel inom loppet av någon eller ett par dagar.

Dosering

Tabletterna tas oftast en gång om dagen, på morgonen.

Vanligen inleds behandlingen med en högre dos som sedan minskas till en bestämd underhållsdos när tillfredsställande effekt erhållits. När behandlingen skall avslutas, bör dosen långsamt trappas ner för att så småningom helt upphöra. Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med läkare.

Biverkningar

Biverkningarna kommer framför allt om man behandlas under en lång tid med kortison, dessutom är de dosberoende.

Vanliga biverkningar kan vara:

- förhöjd sockerhalt i blod och urin
- benskörhet
- vätskeansamling
- högt blodtryck
- hudförtunning, försämrad sårhäkning
- muskelförtvinning.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Risk finns att fostret påverkas.

Man kan använda läkemedlet när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du behöver använda läkemedlet mer än tillfälligt när du ammar bör du rådgöra med läkare.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Berätta alltid för läkare/tandläkare att du är insatt på Prednisolon®. Samtidig behandling med Prednisolon® och andra läkemedel/naturläkemedel kan ibland ge oönskade effekter. Diskutera med din läkare eller sköterska vilka läkemedel du bör undvika.

Om du behöver behandlas med antibiotika så bör du kontakta mottagningen för rådgivning.

Övrigt

Du ska ta kontakt med din mottagning snarast vid tecken på infektion. Läkemedlet kan dölja symtom på infektioner. Dessutom minskar kroppens egna produktion av kortison i binjurebarken vid behandling med Prednisolon® och man kan därför behöva ändra doseringen.

Inför planerade operationer/ingrepp kontaktas mottagningen för rådgivning.

Om du ska vaccinera dig så bör du rådfråga din läkare.

Vissa uppgifter i den information som följer läkemedlet från apoteket gäller behandling av andra sjukdomar och med andra doser. Därför kan de inte direkt överföras på Din behandling och Din situation.