

## Sandimmun Neoral®/Ciklosporin, patientinformation

### Förväntad effekt av Sandimmun Neoral®/Ciklosporin

Vid reumatiska sjukdomar blockerar medicinen vissa immunceller som direkt eller indirekt deltar i utvecklingen av sjukdomen.

Effekten kommer långsamt. Som regel märker man inte någon skillnad förrän efter 1 månad.

### Dosering

Den dagliga dosen ska alltid tas uppdelad på två tillfällen, morgon och kväll. Svälj kapseln hel med ett glas vätska, dock inte grapefruktjuice då detta kan öka koncentrationen av läkemedlet.

### Biverkningar

Vanliga biverkningar är:

- illamående
- kräkningar
- svullet tandkött
- huvudvärk
- ökad behåring
- muskelvärk, domningar och krypningar.
- höjt blodtryck
- nedsatt njur- och leverfunktion.

De flesta biverkningarna är dosberoende och försvinner därför då man sänker dosen eller sätter ut läkemedlet.

Sandimmun Neoral®/Ciklosporin kan påverka mottagligheten för infektioner. Om du drabbas av infektion och/eller hög feber bör du ta kontakt med din mottagning.

### Uppföljning

För att säkerställa att inga oönskade effekter av Sandimmun Neoral®/Ciklosporin uppkommer så kommer blodprov och blodtryck kontrolleras regelbundet.

## **Graviditet och amning**

Erfarenheten av Sandimmun Neoral®/Ciklosporin vid graviditet är begränsad. Rådgör därför alltid med din läkare om du har önskan att bli gravid. Vid amning är det troligt att barnet påverkas och Sandimmun Neoral®/Ciklosporin bör undvikas.

## **Samtidig behandling med andra läkemedel**

Berätta alltid för läkare/tandläkare att du är insatt på Sandimmun Neoral®/Ciklosporin. Samtidig behandling med Sandimmun Neoral®/Ciklosporin och andra läkemedel/naturläkemedel kan ibland ge oönskade effekter. Diskutera med din läkare eller sköterska vilka läkemedel du bör undvika.

Sandimmun Neoral®/Ciklosporin bör inte kombineras med vissa antibiotika, läkemedel mot virusinfektion och svampinfektioner.

Om du behöver behandlas med antibiotika så bör du kontakta mottagningen för rådgivning om ev uppehåll av medicineringen.

Man bör under behandling med Sandimmun Neoral®/Ciklosporin undvika mat med högt kaliuminnehåll.

## **Övrigt**

Du bör alltid rådgöra med din läkare eller sjuksköterska då du ska opereras, får en akut infektion eller annan nytillkommen sjukdom.

Inför planerade operationer/ingrepp kontaktas mottagningen för rådgivning och ev uppehåll av medicineringen.

Om du ska vaccinera dig så bör du rådfråga din läkare.

Vissa uppgifter i den information som följer läkemedlet från apoteket gäller behandling av andra sjukdomar och med andra doser. Därför kan de inte direkt överföras på Din behandling och Din situation.