

## Alfentanil Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

### Alfentanil. Injektionsvätska (0,5mg/ml)

#### Indikationer

- Smärtlindring (gäller anesthesiutbildad personal)

#### Kontraindikationer

Vid analgesi:

- Får ej ges till patienter med andningsdepression.
- Får ej ges till patienter med sekretstagnation.

#### Dosering analgesi

##### Vuxen

- Ge **Alfentanil (0,5mg/ml)**, 0,5-1ml långsamt intravenöst. Kan upprepas till önskad effekt.

##### Barn

- Ge **Alfentanil (0,5mg/ml)**, 0,005mg/kg långsamt intravenöst. Kan upprepas till önskad effekt.

Alfentanil 0,5 mg/ml	kg	5	10	15	20	25	30	40	50
0,005mg/kg	ml	-	-	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5

## Dosering intubation

### Vuxen

- Ge **Alfentanil (0,5mg/ml)**, 0,010-0,025mg/kg

### Försiktighet

- Kan orsaka andningsdepression, hypotension och kräkning
- Används med försiktighet vid astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom och cirkulatorisk chock.

### Biverkningar

- Andningsdepression
- Bradykardi och övergående hypotension
- Illamående och kräkningar
- Yrsel
- Muskelrigiditet

### Speciellt att tänka på

- **Får endast användas av anesthesiutbildad personal.**
- Försiktig dosering hos äldre patienter.
- Om andningsdepression eller hypotension uppträder ventilera patienten och ge eventuellt **Naloxonhydroklorid**