

## Läkemedelsordinationer, generella barnmorskor

Gäller för: Förlossningsavdelningen

Läkemedel som får ordineras av barnmorskor slutenvård

| Indika-<br>tion           | Läkemedel                         | Dosering/<br>maxdos                 | Anmärkning/<br>kontraindikation                                      |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Anemi</b>              | Tabl Duroferon<br>100 mg          | 1 x 2                               |  |
|                           | Niferex 100 mg                    | 1 x 1-2                             |  |
| <b>Blödning</b>           |                                   |                                     | Se PM Uteruskontraherande  |
| <b>Förstopp-<br/>ning</b> | Mixt Laktulos<br>675 mg/ml        | 30 ml per os                        | Ej till bukobs.  |
|                           | Klyσμα Klyx<br>Klyσμα Microlax    | Ett Klyx v b<br>Ett Microlax<br>v b | Ej till pat med sfinkterruptur,<br>gäller både Klyx och<br>Microlax. |
| <b>Halsbränna</b>         | Mixt Novaluzid                    | 10 ml per os 1<br>tim efter måltid  |  |
|                           | Mixt Gaviscon                     | 10-20 ml 1,5<br>efter måltid        |  |
|                           | Brustabl<br>Ranitidin             | 150 mg v b                          |  |
| <b>Hosta</b>              | Mixt Mollipect                    | 15 ml per os<br>x 3                 |  |
|                           | Mixt Nipaxon<br>5 mg/ml           | 10 ml per os<br>x 3                 |  |
| <b>Hemorroider</b>        | Supp Alcosanal<br>Salva Alcosanal | 1 supp x 2                          |  |
|                           | Supp Xyloproct<br>Salva Xyloproct | 1 supp x 2                          |  |
| <b>Illamående</b>         | Lergigan comp                     | 1 tabl v b                          |  |
|                           | Supp Primeran<br>20 mg            | 1 supp v b                          |  |



|                          |  |   |   |
|--------------------------|--|---|---|
|                          | Tabl Primperan<br>10 mg                  | 1 tabl v b                              |   |
|                          | Supp Postafen<br>50 mg                   | 1 supp v b                              |   |
|                          | Tabl Postafen<br>25 mg                   | 1 tabl v b                              |   |
| <b>Nästäppa</b>          | Näsdrp Nezeril<br>0,5 mg/ml              | 1 endospipett i vardera näsborren x 2-4 | Högst 10 dagar i följd.   |
| <b>Rh-neg</b>            | Inj Rhesonativ<br>250 µg =<br>1250 E     | 1 ampull i m                            | Till Rh-neg mammor inom 48-72 timmar post partum.   |
|                          | Inj Rophylac 300 µg = 1500 E             | 2 ml i m                                |   |
| <b>Rubella, ej immun</b> | Inj vacc MMRII<br>Inj Rudivax 0,5 ml s c | Engångsdos s c                          | Post partum.  |
| <b>Smärta</b>            | Tabl Alvedon 500 mg                      | 1-2 x 3-4                               |   |
|                          | Brustabl Alvedon 500 mg                  | 1-2 x 3-4                               |   |
|                          | Panodil 500 mg                           | 1-2 x 3-4                               |   |
|                          | Panodil extend 665 mg                    | 2 x 3                                   |   |
|                          | Inj Carbocain, 10 mg/ml                  | Högst 5 mg/kg kroppsvikt                | Post partum infiltration vid sutur. Till pudendusblockad enligt PM.   |
|                          | Tabl eller Brustabl Citodon              | 1-2 x 2-4                               | <b>Kontraindikation:</b><br>Gallväggsspasm<br><b>OBS</b> Om patienten står på paracetamol måste det bytas ut. |
|                          | Tabl Diklofenak, 50 mg                   | 1 x 2-3, max 150 mg/dygn                | Ej till oförlösta utan läkarordination.   |
|                          | Supp Diklofenak                          | 50 mg v b                               | Ej till oförlösta utan läkarordination  |
|                          | Inj Petidin 50 mg/ml                     | Inj 75-100 mg i m(enstaka dos)          | Under partus: Normal grav, CTG u a.   |
|                          | Inj Morfin 10 mg/ml                      | 5-10 mg i m                             | Postoperativ smärta   |

|   |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <b>Sömn-<br/>löshet</b>                             | Tabl<br>Flunitrazepam<br>1 mg                                     | 1 tabl till natten                  | Enstaka dos.   |
|   | Tabl Propavan   | 1 tabl till natten                  | Enstaka dos.   |
| <b>Uterus-<br/>kontra-<br/>herande</b>              | Tabl Methergin<br>0,125 mg  | 1 x 3 i 3 dagar                     | Endast till förlösta.<br>Försiktighet vid hypertoni och<br>myom. |
|   | Inj Methergin<br>0,2 mg/ml  | 1 ml i v eller<br>i m               | Endast till förlösta.  |
|   | Inj Prostinfenem<br>0,25 mg/ml                                    | 1 ml i 500 ml<br>Glukos<br>50 mg/ml | Enl PM endast till förlösta.                                     |
|   | Inj Syntocinon<br>8,3 µg/ml (5<br>E/ml)                           | 1-2 ml i v eller i<br>m             | Endast till förlösta.  |
| <b>Värk-<br/>stimulans</b>                          | Syntocinon<br>8,3 µg/ml (5<br>E/ml)                               | 1 ml i 500 ml<br>Glukos 50          | V g se PM ang värk-<br>stimulerande dropp.                       |
| <b>Infusions-<br/>lösning - för<br/>cirkulation</b> | Ringer-Acetat   |                                     |  |
| <b>Infusions-<br/>lösning - för<br/>vätska</b>      | Glukos<br>50 mg/ml<br>Glukos =<br>Rehydrex<br>25 mg/ml<br>buffrad |                                     |  |

|   |   |          |  |
|---|---|----------|--|
| <b>Till<br/>det<br/>nyfödd<br/>a<br/>barnet</b> | Inj<br>Konakio<br>n<br>novum<br>10<br>mg/ml | 1 mg i m |  |
|---|---|----------|--|

Infusioner går ej att lägga på GD i Cosmic, används bara på förlossningen.

**Giltig fr.o.m:** 2018-04-30  
**Giltig t.o.m:** 2019-04-30  
**Identifierare:** 117934  
**Läkemedelsordinationer, generella barnmorskor**



**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela  
faktaägare**