

Återbesök till KK

Gäller för: Kvinnokliniken

| Tillstånd | Återbesök |
|---|--|
| Missed abortion CRL <5 cm, erhåller Cytotecbehandling | 2 veckor (fastande). |
| Inkomplett missfall erhåller Cytotecbehandling | 2 veckor (fastande). |
| Komplett missfall | Inget återbesök (men egenkontroll med G-test efter 3 veckor). |
| Nyupptäckt myom | 6 mån (om oförändrad storlek - åter vid symtom). |
| Ovarialcysta med helt benigna fynd som är icke symtomgivande hos fertil kvinna | |
| <5 cm | Ingen kontroll. |
| >5 cm | Kontroll om 3 mån. |
| Ovarialcysta med helt benigna fynd som är icke symtomgivande hos postmenopausal kvinna | |
| <3 cm | Ingen kontroll. |
| 3 cm - 5 cm | Kontroll om 4 mån och 12 mån, sedan avslut CA-125 tages vid 0 och 4 mån. |
| >5 cm | CA-125 och operation |
| Ovarialcysta hos gravida som är icke symtomgivande och med benigna fynd | |
| <8 cm | Expektera till efter partus. |
| >8 cm | Ev operation i 2:a trimestern. |
| Salpingit/endometrit | Åter vid behov. |
| Byte av prolapsring | Första kontroll 3 mån och därefter 1 år. Kan initieras av |

| | |
|--|------------------|
| | VC. |
| Blödning i tidig graviditet (med fosterhjärtaktivitet) och normalt fynd | Inget återbesök. |

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare