

Behandling av svår sepsis och septisk chock med C-vitamin, B-vitamin och hydrokortison

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Intensivvårdsavdelningen Växjö, Intensivvårdsavdelningen Ljungby

Faktaägare: Joakim Ahvenainen, medicinskt ledningsansvarig
Intensivvårdsavdelningen Växjö

Behandlingen avser vuxna.

Indikation:

Svår sepsis med hypotension, som inte svarar på adekvat mängd vätska samt endera hypoperfusion eller organdysfunktion.

Behandling:

1. C-vitamin (askorbinsyra) 1,5gx4 i fyra dagar eller tills utskrivning från IVA.
Administration: 15ml Vitamin C-Rotexmedica (eller motsvarande) 100mg/ml (1,5g) i 85ml NaCl (alt 5% glukos) ges som iv. infusion under 60 minuter.
2. B-vitamin (Tiamin) 200mgx2 i fyra dagar eller tills utskrivning från IVA.
Administration: 4ml Tiacur (eller motsvarande) 50mg/ml (=200mg) i 46ml NaCl ges som iv. infusion under 30 minuter.
3. Hydrokortison (Solu-Cortef eller motsvarande) 50mgx4 iv i sju dagar eller tills utskrivning från IVA.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare