

Miktionsuretrocytografi MUCG - barn

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenheten Växjö

Faktaägare 2: Pia Petersson, sektionsansvarig läkare barn

Metod

Undersökningen utförs på Röntgenavdelningen i Växjö.

Blåskateter sättes på barnkliniken.

Under genomlysning fyller en specialutbildad sjuksköterska eller en röntgenläkare urinblåsan med jodkontrast och dokumenterar detta. När blåsan är full tas bilder när barnet kissar, detta görs med barnet i ryggläge. Även en bild sparas när barnet kissat klart för att visa om blåsan är tom eller ej. Ibland tas även bilder från sidan. Finns det reflux upp till njurarna så tas 5min och 15 min bild.

Indikation

Görs vid utredning efter urinvägsinfektion eller vid misstanke om urinvägsmisbildning.

Kontraindikation

Pågående infektion

Remissinformation

Om barnet har pågående infektion

Patientförberedelser

Barnet kallas och förbereds via barndagvården.

Eftervård

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring