

## Röntgenundersökning av barn med frågeställning invagination

Innan barnet kommer till röntgenavd skall vätskebalans och elektrolytstatus vara kontrollerat och nål vara satt.

En eventuell vätskebalansrubbnig av betydelse ska vara korrigerad innan repositionsförsök. Dock föregås alltid colonundersökning av ultraljud samt en buköversikt, vilken med fördel kan utföras under tiden man väntar på provsvar alternativt droppet går in.

Barn med peritonitstatus skall ej genomgå repositionsförsök. Perforationsrisken är då stor. Lång anamnes, mer än ett dygn, kan också innebära perforationsrisk. Vid misstanke om peritonit eller lång anamnes skall kirurg konsulteras. Barnkirurg i Lund konsulteras på vid indikation.

Det åligger remittenten att se till att ovanstående blir utfört för att undvika att barn i alltför dåligt skick kommer till röntgen för colonundersökning.

Ultraljud samt buköversikt + colonröntgen kan beställas på samma remiss. Om remittenten önskar veta svaret på ultraljud och buköversikt innan colonröntgen påbörjas skall det anges på remissen.

Om undantag från ovanstående anvisningar skall göras (kort anamnes och barn som är opåverkat mellan attacker) så måste remittent och röntgenolog vara överens om det efter samråd.

### Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

### Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring