

# Ventrikel - Magsäcksundersökning barn

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Utförs på:** Röntgenheten Växjö

**Faktaägare 2:** Pia Petersson, sektionsansvarig läkare barn

## Metod

### Pylorusstenos-frågeställning

I första hand utförs ultraljudsundersökning om denna undersökning är svårbedömd eller om läkare med denna erfarenhet ej är tillgänglig utförs ventrikelundersökning. Kontrast ges då till barnet via sond. I genomlysning bedöms och dokumenteras herefter magsäckens tömningsförmåga och utseendet av magsäck och nedre magmun.

## Indikation

Vid frågeställning pylorusstenos (trång nedre magmun) utföres undersökningen mer eller mindre akut. Vid denna frågeställning är dock numera ultraljudsundersökning förstahandsvalet.

## Kontraindikation

## Remissinformation

## Patientförberedelser

Vid undersökning med avseende på pylorusstenos, vilket kan ske mer eller mindre akut, skall barnet ha ventrikelsond och vara fastande sedan 2-4 timmar.

## Eftervård

Extra vätska om barnet fått bariumkontrast, undersökningsdagen och dagen efter.

## Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

## Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

## Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring