

Flebografi

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenenheten Växjö, Röntgenenheten Ljungby

Metod

Förstahandsundersökningen är Ultraljud (ben)

Benflebografi

Undersökningen görs med patienten halvliggande. En perifer ven på fotryggen punkteras och en liten nål ("butterfly" eller "venflon") inlägges. Genom denna sprutas kontrast under bildtagning. Inte sällan kan det vara svårt att hitta en "bra" ven hos dessa patienter, som ofta har svullna fötter, och patienten kan behöva utstå många punktionsförsök.

Undersökningen omfattar normalt venerna upp till eller till och med bäckenvenerna. Undantagsvis krävs punktion av venen i ljumsknivå.

Armflebografi

Undersökning av armens vener. Undersökningen omfattar normalt underarmens och överarmens vener samt v subclavia och eventuellt v cava superior (övre hålvenen). Undersökningen utförs vid misstanke om blodpropp. Den görs i liggande och kontrasten insprutas via nål ("venflon" eller "butterfly") på handen eller armbågsvecket.

Vid misstanke om armvenstrombos utförs ultraljudsundersökning eller flebografi, beroende på undersökarens erfarenhet.

Indikation

Utförs vid misstanke om djup ventrombos (blodpropp). Utförs numera sällan eller aldrig inför operation av åderbräck. (Klin.fys. utredningar görs i så fall istället.)

Kontraindikation

Kontrastallergi, högt krea

Remissinformation

Kontrastallergier, kreatenin. Var patienten befinner sig. Telefon nummer till patienten om inte tid bestämts via samtal med oss på röntgen.

Patientförberedelser

Innan ni skickar en patient till röntgenavdelningen för flebografi måste ni kontakta oss, Växjö tel 587550, Ljungby tel 585290 så att vi kan överenskomma

om en lämplig tidpunkt. Om ni inte ringe skriv var patienten nås och telefonnummer.

Kreatininprov och uppvätskning vid behov.

Eftervård

Extra vätska

***Metformin** ökar risken för njurskada (och laktacidosis) vid undersökningar med intravenös kontrast. Om patienten tar preparat som innehåller metformin skall:

- S-kreatinin kontrolleras av inremitterande läkare, innan undersökning
- Metformin utsätts i samband med undersökning oavsett njurfunktion
- S-kreatinin skall kontrolleras av remittenten tidigast 48h efter us före återinsättning av metformin.

se riktlinjer för metformin

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring