

Datortomografi hals

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Röntgenenheten Ljungby, Röntgenenheten Växjö

Faktaägare 2: Agnieszka Athley, sektionsansvarig läkare Öron näsa hals

Metod

Undersökningen görs i ryggläge, beroende på frågeställning utan eller med intravenös kontrast.

Indikation

Undersökningen utförs vid utredning av expansiva processer i halsregionen som t ex förstörade lymfkörtlar, tumörer, cystor och annat.

Kontraindikation

Kontrastallergi

Remissinformation

Kreatinin aktuellt

Patientförberedelser

Inneliggande säger vi till om PVK och s-kreatinin vid behov.

***Metformin** ökar risken för njurskada (och laktacidosis) vid undersökningar med intravenös kontrast. Om patienten tar preparat som innehåller metformin skall:

- S-kreatinin kontrolleras av inremitterande läkare, innan undersökning
- Metformin utsätts i samband med undersökning oavsett njurfunktion
- S-kreatinin skall kontrolleras av remittenten tidigast 48h efter us före återinsättning av metformin.

se riktlinjer för metformin

Eftervård

Ingen

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring