

## Tunntarmsundersökning - barn

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Utförs på:** Röntgenheten Växjö

### Metod

Kontrasttillförsel sker per oralt om barnet kan dricka. Annars via sond.

### Indikation

Utföres vid misstanke malrotation eller andra missbildningar.  
Vi bedömer från fall till fall om vi kan göra MR på små barn. Är dock mkt ovanligt med inflam tarmsjd före tonåren

### Kontraindikation

Ingen känd

### Remissinformation

Information om barnet kan dricka.

### Patientförberedelser

Fastande 2-4 timmar beroende på ålder

**Barn 0-3 år:** 3-4 timmars fastande, beronde på ålder.

**Barn 3-6 år:** Ingen fast föda efter kl 20 kvällen före undersökningen, men får dricka som vanligt.

Förmiddagen dagen före undersökningen: 1 tub Microlax.

Kvällen före undersökningen: 1 tub Microlax. OBS! Endast 2 cm av tubens spets får införas i ändtarmen.

**Barn 6-12 år:** Ingen fast föda efter kl 20 kvällen före undersökningen, men får dricka som vanligt.

Morgonen dagen före undersökningen: 1 tablett Dulcolax.

Kvällen före undersökningen: 1 tub Microlax.

Undersökningsdagens morgon: 1 tub Microlax.

**Barn över 12 år:** Ingen fast föda efter kl 20 kvällen före undersökningen, men får dricka som vanligt.

Morgonen dagen före undersökningen: 2 tabletter Dulcolax.

Kvällen före undersökningen: 2 tabletter Dulcolax.

Undersökningsdagens morgon: 1 tub Mikrolax.

**OBS!** Barn som påtagligt avviker i vikt från genomsnittet i åldersgruppen förberedes som för närmast lägre eller högre åldersgrupp.

## Eftervård

Extra vätska efter undersökningen och dagen efter.

## Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.

## Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

## Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring