

Läkemedel och infusionsaggregat IVA Växjö

Gäller för: Anestesiavdelningen

Utförs på: Intensivvårdsavdelningen Växjö

Faktaägare: Ann-Sofie Jansson, sjuksköterska, Intensivvårdsavdelningen Växjö

Pia Törndahl, Läkemedelsenheten, Susanna Lundvall, Vårdhygien.

Hållbarhet och beredningstider		
B		
Blodtransfusionsaggregat	Max 4 tim.	Nytt aggregat om systemet stått stilla. Tänk rimligt antal påsar per aggregat då leverantör inte kan säga exakt antal.
C		
CeloCurin	2 mån i rumstemperatur.	
E		
EDA infusionsvätska - lagerberedd	72 tim – se läkemedelsblandningar IVA Växjö.	Bupivacain/Sufentanil 1 mg/ml + 1 µg/ml -500 ml påse. Ropivacain 2 mg/ml -200 ml påse.
EDA infusionsvätska – ssk-beredd	24 tim – se läkemedelsblandningar IVA Växjö.	
Esmeron (Rocuronium)	2 mån i rumstemperatur.	



I		
Infusionsaggregat	3 dygn. <u>1 dygn vid fettlösningar som Propofol eller Kabiven.</u>	
Infusionsaggregat till sprutpump	<u>3 dygn.</u> <u>1 dygn vid fettlösning som Propofol.</u>	MicroClave till sprutan byts då aggregatet byts.
Infusioner med tillsats	24 tim.	Ex. Glukos med Na + K-tillsatser.
Infusioner utan tillsats	24 tim.	Ex Glukos, Ringer-Acetat, Plasmalyte
Insulin öppnad 10 ml ampull	7 dygn, förvaras mörkt i rumstemperatur.	Ex Humalog, Insulin Lispro Sanofi
Isoprenalina	6 mån i rumstemperatur.	
K		
Klorhexidinsprit öppnad flaska	1 mån.	Sprutpumpen byts vid flaskbyte.
L		
Läkemedel icke beredd eller beredd lösning till sprutpump	12-24 tim.	Se läkemedelsblandningar IVA Växjö. OBS! Propofol, Ergenyl, Esomeorazol, Pentocur (tiopental), Pro-Epanutin
Läkemedel (i 1-20 ml spruta) till intermittent administrering	12 tim.	
P		
PCA aggregat	7 dygn.	

PCA infusionskassett	7 dygn.	
R		
Ranger infusionsaggregat till värmare	24 tim vid kontinuerlig infusion. Max 4 tim vid blodtransfusion.	Nytt aggregat om systemet stått stilla. Tänk rimligt antal påsar per aggregat då leverantör inte kan säga exakt antal.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.