

Angiografi vid endovaskulära ingrepp som PTA och stentinläggning

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Ulla Svanström, narkossköterska, Lennart Löf, narkosläkare, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

Angiografi vid endovaskulära ingrepp som PTA och stentinläggning	1
1 Ingrepp	2
2 Indikation	2
3 Preoperativa förberedelser.....	2
3.1 Patient:.....	2
3.2 Anestesi:.....	2
3.3 Operation:.....	2
4 Position.....	3
5 Utrustning	3
6 Hygien.....	3
7 Elimination.....	3
8 Anestesi.....	3
8.1 Utförande:.....	3
9 Läkemedel övriga	3
10 Steril utrustning	3
11 Preparathantering.....	3
12 Peroperativ vård	3
13 Särskilda observanda.....	4
13.1 Anestesigång:.....	4
13.2 Operationsgång:.....	4
14 Postop	4
14.1 Övervakning.....	4
14.2 Cirkulation	4
14.3 Elimination	4

14.4	Mobilisering.....	4
14.5	Smärta.....	4
14.6	Hud.....	4

1 Ingrepp

Angiografi vid endovaskulära ingrepp som PTA (perkutan transluminal angioplastik) och stentinfällning.

2 Indikation

Ischemi

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation:

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi.
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning- lokala riktlinjer](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning enligt riktlinje](#)
- [Antibiotikaproylax enligt riktlinje](#)
- Noggrann trycksårsproylax.

3.2 Anestesi:

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- **Blodgruppering: Ja**
- **Bastest: Nej**

3.3 Operation:

4 Position

[Se bild](#)

- Ryggläge
- Kolfibertopp – kan bara användas på sal 5 och 1.
- Båda armarna ut på armbord
- Bar hud mot Ligasano
- Kudde i knäveck på det friska benet, samt hälskydd
- Benpåse och mössa
- Klimatplatta samt Ligasano på bordet.

5 Utrustning

- Diatermi
- Baerhugger
- Käril- C-Båge
- Doppler

6 Hygien

Mössa– hjälmmodellen och munskydd.

- [Arbetsklädsel- lokala anvisningar](#)
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning – Vårdhandboken.](#)

7 Elimination

- KAD

8 Anestesi

8.1 Utförande:

- Ibland EDA eller spinal.
- Ibland generell anestesi.

9 Läkemedel övriga

- Klexane 100 mg/ml, 0.2 ml iv efter ordination av operatören.
- Omnipaque.

10 Steril utrustning

[G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Käril\Instrumentlistor](#)

11 Preparathantering

[Länk](#)

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken.

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång:

- Minst 2 st PVK, 1.1
- Koppla upp varma vätskor.
- Noggrann trycksårsprofylax.
- [Antibiotikaprofylax enligt riktlinje](#)
- Övervakningslista för kärlopererade patienter på postop/IVA skall fyllas i av NSK när operatör lyssnat med Doppler och INNAN patienten lämnar operationssalen.

13.2 Operationsgång:

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

14.1 Övervakning

Övervakningslista för kärlopererade patienter.

14.2 Cirkulation

Kontroll av förband, distalstatus och pulsationer i det opererade benet/foten eller i båda fötterna och benen enligt schema, beroende på var stenten sitter.

Perifer cirkulation kontrolleras med Doppler i arteria Dorsalis pedis och Tibialis posterior, enligt schema, samt vid misstanke om okklusion eller försämrad cirkulation.

Vid misstanke om okklusion eller försämrad cirkulation- kontakta kärlkirurg.

Kontroll av färg, temperatur, känsel och rörlighet i foten.

Kontroll av vaderna, observation på kompartmentsyndrom.

14.3 Elimination

KAD

14.4 Mobilisering

I första hand lägesändringar . Övrig mobilisering när allmäntillståndet tillåter, samt godkännande av kärlkirurg.

14.5 Smärta

Epiduralkateter kan förekomma.

14.6 Hud

Kontroll av förband och operationsområde.

Kontroll av fötterna och benen med avseende på färg, temperatur, smärta och känsel.

Trycksårsprofylax.

Giltig fr.o.m: 2019-09-16

Giltig t.o.m: 2021-06-11

Identifierare: 151790

Angiografi vid endovaskulära ingrepp som PTA och stentinläggning



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare