

Gynekologiskt cellprov, avvikande provsvar dysplasibarnmorska

Gäller för: Kvinnokliniken

ASCUS/LSIL (cytologi vid screening)

Kvinnor 23-27 år Flödesschema 1 (Triage med HPV som reflextest)	Åtgärd
HPV negativ	Åter till GCK (3 år)
HPV positiv	Nytt cytologprov utan HPV hos barnmorska inom 4 månader efter indexprovet. Om cytologprov är avvikande till kolposkopi inom 6 månader efter indexprovet. Vid normalt cellprov men bärare av HPV 16, 18 till nytt cellprov och HPV test efter 18 månader. Övriga HPV typer GCK efter 3 år.
Kvinnor 28-29 år Flödesschema 1 (Triage med HPV som reflextest)	Åtgärd
HPV negativ	Åter till GCK (3 år)
HPV positiv	Kolposkopi inom 3-4 månader från indexprovet
Kvinnor 30-70 år Flödesschema 2 I denna åldersgrupp är primärscreening (indexprovet) HPV analys. Vid positivt HPV-test görs det automatiskt cytologitest som reflextest på samma prov.	Åtgärd
HPV positiv/cytologi negativ	Kontrollfil HPV om 18 månader vid HPV 16,18 och om 3 år för övrig typ av HPV. HPV negativ efter kontroll: åter till GCK (enligt normal rutin 3 eller 7 år) HPV positiv (cytologi efter reflextest) : Kolposkopi inom 3 månader

Kvinnor 30-70 år fortsättning	Åtgärd
HPV positiv/cytologi positiv	Till kolposkopi och cytologprov inom 3 månader
HPV negativ/cytologi ascus, LSIL	Åter GCK (enligt normal rutin 3 eller 7 år)
HPV negativ/cytologi HSIL	Kolposkopi inom 3 månader
Kvinnor 40 år Flödesschema 3 (primärscreening inkluderar både cytologi och HPV test)	Åtgärd
Avvikande cytologi oavsett HPV status	Kolposkopi inom 3 månader
HPV 16 eller 18 positiv/ cytologi negativ	Nytt HPV om 18 månader via kontrollfil HPV
HPV non 16 eller 18 pos/cytologi neg	Nytt HPV om 3 år via kontrollfil HPV
HPV neg/cytologi neg	Åter GCK (enligt normal rutin 3 eller 7 år)

HSIL/ASC-H (Cytologi vid screening)

Kolposkopi inom 3 månader. Kompletterande HPV inför läkarbesöket.

Övriga grupper

Gravida kvinnor	Åtgärd
HPV pos/ascus eller LSIL samt övriga cellförändringar oavsett HPV status	Kolposkopi snarast
Endocervikalceller saknas, normal cellprov	Åtgärd
För kvinnor utan tidigare cellförändringar	Fortsatta kontroller via GCK
För kvinnor som tidigare behandlats för cellförändringar	Första gången ingen åtgärd. Vid andra uppföljningsprov till gyn mottagningen
Misstanke om skivepitelcancer, adenocarcinom in situ/ misstanke om adenocarcinom	Kolposkopi snarast
Körtelcellsatypi, oklarcellsatypi	Kolposkopi inom 3 månader
Ej bedömbart prov	Ny provtagning hos barnmorska/ssk, vid andra gången till kolposkopi inom 3 månader
HPV självtest	HPV neg: åter GCK HPV pos: Kolposkopi inom 3 månader

Giltig fr.o.m: 2019-10-17

Giltig t.o.m: 2021-06-14

Identifierare: 152070

Gynekologiskt cellprov,avvikande provsvar dysplasibarnmorska



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare