

Inläggning av bröstprotes

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Ulla Svanström, narkossköterska, Lennart Löf, narkosläkare, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

Inläggning av bröstprotes.....	1
1 Ingrepp.....	2
2 Indikation	2
3 Preoperativa förberedelser.....	2
3.1 Patient:.....	2
3.2 Anestesi:.....	2
3.3 Operation:.....	2
4 Position.....	3
5 Utrustning.....	3
6 Hygien.....	3
7 Elimination.....	3
8 Anestesi.....	3
8.1 Utförande.....	3
9 Läkemedel övriga	3
10 Steril utrustning	3
11 Preparathantering.....	3
12 Peroperativ vård	4
13 Särskilda observanda.....	4
13.1 Anestesigång:.....	4
13.2 Operationsgång:.....	4
13.3 Särskilda observanda	4
14 Postop	4
14.1 Mobilisering.....	4
14.2 Hud.....	4
14.3 Postoperativa hjälpmedel	4

14.4 Information till patienten4

1 Ingrepp

Inläggning av bröstprotes.

2 Indikation

Rekonstruktion i samband med eller efter bröstcanceroperation.

Medfödda missbildningar.

Byte av protes.

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Patienten opereras dagkirurgiskt eller slutenvårds.

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi.
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)- lokala riktlinjer.
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning enligt riktlinje](#)
- [Antibiotikaproylax enligt riktlinje](#)
- Skall prova ut och ha på sig en special-BH samt en extra BH med hem vid utskrivning.
- Kontroll av legitimation.
- Id-märkning.

3.2 Anestesi:

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- **Blodgruppering: Ja**
- **Bastest: Nej**
- Blodtryck och PVK i motsatt sida alternativt underben.
- Noggrann trycksårsprofylax.

3.3 Operation:

- Kontrollera att aktuell protes finns på operation i två exemplar samt ett TGR-Nät.

4 Position

Se bilder:

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\PLATINA\Kirurgsektionen\Uppläggningsbilder
Kirurgsektionen

- Ryggläge med båda armarna på armbord.
- Kuddar i knäveck, samt hälskydd, rem över benen.
- Benpåsar.
- Assistenten står ovanför armen på den sida som skall opereras.
- Ibland får man perioperativt ”sätta patienten upp” för att kontrollera att det blir jämt.

5 Utrustning

- Diatermi
- Baerhugger
- Ranger vätskevärmare

6 Hygien

Mössa– hjälmmodellen samt munskydd.

- Slussning på salen, stängda dörrar.
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning – Vårdhandboken.](#)
- [Arbetsklädsel-](#)lokala anvisningar.

7 Elimination

- Bladderscan före anestesistart samt efter avslutad operation enligt riktlinjer. Vid behov urintappas patienten efter.
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation-vuxna patienter](#) – lokala anvisningar

8 Anestesi

8.1 Utförande

- Generell anestesi.
- I första hand Total Intravenös Anestesi

9 Läkemedel övriga

10 Steril utrustning

Se sökväg: G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Bröst,
Endokrin\Instrumentlistor.

11 Preparathantering

[Länk](#)

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken.

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång:

- Noggrann trycksårsprofylax.
- Minst 1 PVK.
- [Antibiotikaprofylax enligt riktlinje](#), hela dosen skall ha givits innan knivstart!
- Före väckning skall BH och eventuellt bröstband sättas på plats!

13.2 Operationsgång:

-

13.3 Särskilda observanda

- Viktigt att antibiotika har givits före knivstart.
- Före väckning skall BH och eventuellt bröstband sättas på plats!

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

14.1 Mobilisering

Information om mobilisering får patienten i handen på bröstmottagningen.

- Under 6 veckor postoperativt undvika tunga lyft och rörelser där det stramar över bröstkorgsväggen.
- Under 3 veckor inte höja armbågarna ovan axelnivå.

14.2 Hud

Förband ska sitta på i 7 dagar, steristrip i 14 dagar.

14.3 Postoperativa hjälpmedel

Får BH som ska användas som stöd de första veckorna, se patientinformationsblad.

Bröstband för att hjälpa till att hålla protesens fixerad. Det ska sitta på dygnet runt i 3 veckor (kan tas av vid dusch).

14.4 Information till patienten

Läkarsamtal

Återbesök till bröstmottagningen.

Patientbroschyr operation inläggning av bröstprotes.

Informera om att kontakta bröstsjuksköterskan på kirurgmottagningen vid eventuella frågor eller besvär. Vid akuta besvär kväll och natt kontakta 1177/akutmottagningen.

Giltig fr.o.m: 2020-01-01
Giltig t.o.m: 2021-12-20
Identifierare: 152194
Inläggning av bröstprotes



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare