

Nicardipine

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Intensivvårdsavdelningen Växjö

Faktaägare: Anders Lindgaard Andersen, överläkare, anestesikliniken Växjö

Injektionslösning koncentration 2,5mg/ml.

Indikation:

Nicardipine kan användas som **andra linjens behandling** av akut livshotande hypertoni vid:

- Malign arteriell hypertoni/hypertensiv encefalopati
- Aortadissektion
- Svår preeklampsi

Kontraindikation:

- Allvarlig aortstenos
- Kompensatorisk hypertoni, t.ex. vid förekomst av arteriovenös shunt eller aortaförträngning
- Instabil angina
- Inom 8 dagar efter hjärtinfarkt

Dosering:

Vuxna

Initial dos: Börja med kontinuerlig intravenös infusion (perifert eller centralt) med 3–5 mg/tim under 15 minuter. Hastigheten kan ökas med 0,5 -1 mg var 15:e minut. Infusionshastigheten bör inte överstiga 15 mg/tim.

Underhållsdos: När målblodtrycket är uppnått bör dosen minskas gradvis, vanligen till 2–4 mg/tim, för att behålla den terapeutiska effekten.

Gravida, initial dos 1-5mg/tim.

Äldre patienter och patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion kan vara känsligare för effekten av nicardipine. Initial dos 1-3mg/tim

Blandning:

Injektionslösning Nicardipine 2,5mg /ml 20ml späds med 30ml Natriumklorid 9mg/ml (alternativt Glukos 50mg/ml) . Detta ger 50ml med koncentration Nicardipine 1mg/ml.

Giltig fr.o.m: 2019-08-12

Giltig t.o.m: 2021-08-08

Identifierare: 154729

Nicardipine



Länkar:

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2013/20131220127401/anx_127401_sv.pdf

Intravenous Nicardipine, Curran, M.P., Robinson, D.M. & Keating, G.M. Drugs (2006) 66: 1755. <https://doi.org/10.2165/00003495-200666130-00010>

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.