

Gastroskopi på endoskopienheten

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Suzanne Norbe anestesijuksköterska, operationsenheten Växjö

Undersökning av eosophagus/ventrikel/duodenum.

1 Preoperativt

- Sedvanliga fasterutiner, fasta från kl 24.00, därefter klar dryck fram till 2 timmar innan kallelsen.
- Hälsodeklaration.
- Anestesibedömning av ansvarig anesthesiolog.
- PVK.
- ID band(stämplas upp på undersökningsrummet).
- Egna kläder.
- Läkarsamtal på undersökningsrummet.

2 Peroperativt

- Uppkoppling med blodtryck, EKG(3-avledning) SaO₂, O₂ grimma.
- Pat i sidoläge på brits.
- Ingreppet sker i Propofolsedering, initialt 1-1,5 mg/kg, beroende på ålder och allmäntillstånd. Individuell dosering.
- Pump ställs in med Propofolprogram, TIVA, ålder och vikt.
- Bitblock mellan tänderna.
- Vid gäspning börjar skopisten föra ner gastroskopet.
- Undersökningen tar inte så lång tid, man hinner oftast inte sänka dosen.
- Sedvanliga kontroller.
- Anestesijournal fylls i och lämnas till sekreteraren på preop för inskanning.
- Ge inga opiater.
- Koppla bort övervakningen, dela kopplingarna, patienten kör ut till postop.

3 Postoperativt

- Övervakning med blodtryck, EKG SaO₂ tills patienten är vaken.
- Fri mat o dryck.
- Ej köra bil.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare