

Handläggning av stickskador jourtid på Jourläkarcentralen

Gäller för: Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Utförs på: Hälso- och sjukvårdsnämnd, Primärvård och rehab, Primärvårdsjour, Jourläkarcentralen Växjö

Faktaägare: Gunilla Östgaard Chefläkare/Primärvårdens jourverksamhet

De instruktioner som finns är ju att man ska uppsöka företagshälsovård eller motsvarande och ta 0-prov. Detta gäller ju som huvudregel. De gånger man får göra undantag för detta och göra en snabbare bedömning är ju:

Om man har stuckit sig på en nål där man vet att patienten var infekterad med någon typ av blodsmitta. Då ska man snabbt ta 0-prov och även kontakt med Infektionskliniken för att se om man behöver ge någon typ av profylax.

I normala fall ska man ta 0-prov och prov på den patient som nålen användes på. De skäl som finns att göra detta på JLC är ju om man vet att patienten har blodsmitta alternativt om det av praktiska skäl är enklast om det blir taget på JLC t.ex. om patienten kommer att åka bort och blir svårt att ta prov på.

Som jag tänker det händer sådana här saker oftast i sjukvården där det finns personal som kan åtgärda det hela. Det enda tillfället då JLC kan behöva bli inkopplad är ju t.ex. om det sker på tandläkarmottagning jourtid. Det kan ju då av praktiska skäl vara enklast att ta provet på JLC samma dag då det kanske blir svårt att få provet taget annars.