

## Dexdor och Ketanest nasalt till barn på IVA Växjö och Ljungby

**Gäller för:** Anestesiavdelningen

**Utförs på:** Intensivvårdsavdelningen Växjö, Intensivvårdsavdelningen Ljungby

**Faktaägare:** Joakim Ahvenainen medicinskt ledningsansvarig IVA Växjö

För smärtsamma procedurer, som t ex nålsättning, föreslås Ketanest, både för analgetisk effekt och färre antal nasala sprayningar som behövs jämfört med Dexdor.

### Dexdor nasalt

Indikation: Procedurer med liten eller ingen smärta.

Kontraindikation: Hjärtsjukdom, AV-block II och III, bradykardi.

Dos:

5-20kg: (1-)2µg/kg

20-50kg: 2-4µg/kg

Kan upprepas.

Ge i lägre spannet om högre vikt. Maxdos 100µg/gång

Administration:

Dexdor 100µg/ml Nasalt. En millilitersspruta med MAD nebulisator rikta mot örat på samma sida. Lägg till 0,1ml som fastnar i nebulisatorn vid första sprayningen. Max 0,2ml per näsborre och sprayning. Absorptionen dålig om det rinner ner i svalget.

Anslagstid: cirka 30 min.

Övervakning: Pulsoximetri eller efter IVA-behov.

För längre sederingar se barnklinikens PM [Dexdor – dosering till barn för sedering](#)

## Ketanest nasalt

Indikation: Smärtsamma procedurer. Över 5kg och 6mån.

Kontraindikation: Förhöjt intrakraniellt tryck.

Dos: 1-2mg/kg kan ge ytterligare 1-2mg/kg vid behov.

Administration:

Ketanest 25mg/ml i en eller två milliliterspruta med MAD riktad mot örat på samma sida. Lägg till 0,1ml som fastnar i nebulisatorn. Fördela gärna dosen på båda näsborrarna om över 1ml. Max 1ml per näsborre.

Anslagstid cirka 20 minuter. Vid lägre doser längre.

Övervakning: Pulsoxymetri eller efter IVA-behov.



Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare