

Laparoskopiskt ärrbräck, parastomalt bräck

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Lennart Löf överläkare, anestesikliniken, Ulla Svanström narkossköterska kirurgsektionen, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

1	Ingrepp	2
2	Indikation	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient:	2
3.2	Anestesi:.....	2
3.3	Operation.....	2
4	Position.....	2
5	Utrustning	3
6	Hygien.....	3
7	Elimination.....	3
8	Anestesi	3
8.1	Utförande:.....	3
9	Läkemedel övriga	3
10	Steril utrustning	3
11	Preparathantering.....	3
12	Peroperativ vård	3
13	Särskilda observanda	3
13.1	Anestesigång:.....	3
13.2	Operationsgång:.....	3
14	Postop.....	4
14.1	Mobilisering.....	4
14.2	Läkemedel.....	4
14.3	Hud.....	4

1 Ingrepp

Laparoskopiskt ärrbräck.

Parastomalt bräck.

2 Indikation

Ärrbräck är en komplikation till tidigare abdominell kirurgi.

Parastomalt bräck uppstår bredvid stomier. Innehåller ofta oment eller tarmar.

Indikation är inklämning, smärtor, bandageringsproblem.

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation:

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesi kliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning](#)
- [Antibiotikapofylax vid kirurgi](#)
- Noggrann [trycksårsprofylax](#)

3.2 Anestesi:

- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- **Blodgruppering: Ja**
- **Bastest: Ja**

3.3 Operation

-

4 Position

Se bilder: G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\PLATINA\Kirurgsektionen\Uppläggningsbilder
Kirurgsektionen

- Ryggläge.
- Bägge armarna inbäddade utmed sidorna med draglakan och Ligasano så att det finns möjlighet att operera från båda sidorna vid behov.
- Kudde i knäveck och hälskydd.
- Benrem.

- Bar hud mot operationsbordet, vänd skjortan.
- Benpåsar och mössa

5 Utrustning

- Diatermi
- Baerhugger

6 Hygien

- Mössa – hjälmmodellen
- Eventuellt munskydd.
- [Arbetsklädsel](#)- lokala anvisningar
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning](#) - Vårdhandboken

7 Elimination

- Bladderscan före anestesistart samt efter avslutad operation enligt riktlinjer Vid behov urintappas patienten efter bladderscan eller sätts korttids-KAD på patienten enligt ordination av anestesiläkare.
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation-vuxna patienter](#) – lokala anvisningar

8 Anestesi

8.1 Utförande:

- Generell anestesi, intuberad och relaxerad patient

9 Läkemedel övriga

10 Steril utrustning

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Övre Gastro\Instrumentlistor

11 Preparathantering

[Länk](#)

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång:

- 2 PVK.

13.2 Operationsgång:

I samband med operationen får en del patienter en gördel. Detta ordineras av operatören.

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

14.1 Mobilisering

Höjd huvudända.

14.2 Läkemedel

Vid inläggning av nät ska antibiotikaproylax ges.

14.3 Hud

Gördel kan förekomma.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.