

Marsupialisation av glandula Bartholin

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Anders Andersen överläkare, Kerstin Gustafsson sektionsansvarig gyn, operationsenheten Växjö, Eva Hagelberg undersköterska, Anna Söderberg narkosköterska, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

1	Ingrepp.....	2
2	Indikation	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient:.....	2
3.2	Anestesi:.....	2
3.3	Operation:.....	2
4	Särskilda observanda.....	2
4.1	Anestesi.....	2
4.2	Operation.....	3
5	Position.....	3
6	Utrustning.....	3
7	Hygien.....	3
8	Elimination.....	3
9	Anestesi.....	3
10	Läkemedel övriga	3
11	Steril utrustning	4
12	Preparathantering.....	4
13	Peroperativ vård.....	4
14	Postop.....	4
14.1	Elimination	4
14.2	Information till patienten	4

1 Ingrepp

Marsupialisation av glandula Bartholin.

2 Indikation

Bartolinit är en infektion i blygdsläppen. Den infekterade körteln töms på var och ibland behöver den tas bort för att besvären inte ska komma tillbaka.

3 Preoperativa förberedelser

Patienten kan opereras dagkirurgiskt eller inläggande.

3.1 Patient:

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi.
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- Samtal med operatör samt eventuellt anestesilog.
- Kontroll av legitimation.
- ID-märkning.
- Patienten ska kissa före operation.

3.2 Anestesi:

- Vidta nödvändiga profylaktiska åtgärder för att undvika peroperativ hypotermi, [Hypotermi – perioperativ profylax och behandling](#)
- [Svår toxisk reaktion av lokalbedövningsmedel](#)
- [Blodgruppering/bastest inför operation](#) – Kvinnokliniken Växjö.
- Blodgruppering: Nej
- Bastest: Nej

3.3 Operation:

- Benstöd och armstöd.

4 Särskilda observanda

4.1 Anestesi

Antibiotika ges vid behov efter ordination av operatör.

- [Antibiotikaprofylax vid gynekologiska operationer](#)
- [Antibiotika beredning och injektion/ infusion](#)

4.2 Operation

Marsupialisation (uppskärning av cysta) genom att man skär en slits i en abscess eller cysta och suturerar slitsen kanter mot varandra. Suturerad på detta sätt är platsen öppen och kan sig tömma sig fritt.

- Eventuellt allmän odling.
- Eventuellt läggs ett penrosedrän.

5 Position

Uppläggning enligt **Arbetsrutin - uppläggning i benstöd på gyn sektionen**

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\PLATINA\Gynsektionen\Bibliotek_uppläggning_gyn

- Ryggläge med benstöd
- Båda armarna ut
- Benpåsar
- Benstöd i max 2 timmar. [Operation med patient i benstöd](#)

6 Utrustning

- Bairhugger
- Sug och diatermi
- ”Görans platta” eller Trebensbordet
- Eventuellt motorspruta.

7 Hygien

- Mössa av hjälmmodell.
- Munskydd för all personal på en armlängds avstånd till operationsområdet.
- [Arbetsklädsel- lokala anvisningar](#)
- [Personal föreskrifter för operations avdelning – Vårdhandboken.](#)
- [Hygienriktlinjer för operationssjukvård CLV/LL](#)

8 Elimination

- Bladderscan före anestesistart samt efter avslutad operation enligt riktlinjer.
- Urintappning eller kortids-KAD vid behov enligt ordination av anestesiläkare/operatör
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation-vuxna patienter](#) – lokala anvisningar

9 Anestesi

Generell anestesi med larynxmask:

- T.ex. Propofol/Fentanyl/Sevofluran/O2/luft

Alternativt:

- Propofolsedering/Fentanyl/O2+lokalbedövning
- Spinal (saddle block) Marcain spinal tung 5mg/ml

10 Läkemedel övriga

[PONV profylax](#) – Lokala riktlinjer

Lokalbedövning Carbocain Adrenalin 5 mg/ml+5µg/ml

11 Steril utrustning

Se omvårdnadsriktlinjer i pärm ”Gyn operationer” och på G-servern.
(G:)/Ane/Centralop /Omv_riktlinjer /operation/Gynsektionen /Marsupialisation av glandula Bartholin

12 Preparathantering

Klinisk mikrobiologi [Provtagningsanvisningar](#)

13 Peroperativ vård

[Peroperativ vård - vårdhandboken](#)

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

14.1 Elimination

Patienten ska kunna kissa före hemgång

14.2 Information till patienten

Återbesök vid behov.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.