

# Rutin gällande endoskoptisk verksamhet under Covid-19 pandemin

**Gäller för:** Region Kronoberg

**Utförs på:** Region Kronoberg

Fortlöpande ställning ska tas till vilka patienter som ska kallas för endoskopi med hänsyn till rådande smittsituation för Covid-19 i Kronoberg, tillgängliga personalresurser och skyddsmateriel. Situationen kan ändras vecka för vecka.

## Generellt gäller

- Ej utföra elektiva skopier på patienter >70 år eller med svåra underliggande sjukdomar om det inte rör sig om SVF eller Prio 1.
- Ej kalla patienter med elektiva indikationer som kan vänta 3 månader utan större medicinsk risk (kontroll efter polypektomi, post divertikulit, uppföljning för IBD, Barretts esofagus, ulcuskontroll utan egentlig malignitetsmisstanke etc).
- Vid omfattande samhällssmitta bör endoskopier utföras synnerligen selektivt, i princip bara de akuta och SVF/Prio1 där endoskopin kan förväntas vara omedelbart avgörande för utgången.

## Riskbedömning innan endoskopi

- Alla patienter informeras med extra bilaga vid kallelse om att boka om sin undersökning vid feber eller symtom på luftvägsinfektion.
- Alla patienter riskbedöms per telefon dagen innan.
- Screeningfrågor:
  - Anamnes på feber, andfåddhet, hosta, halsont (även lindrigt) eller diarré?
  - Familjemedlemmar eller andra nära kontakter med ovanstående symtom?
  - Kontakt med person med bekräftad eller misstänkt Covid-19?
- Undersökningdagen sker samma riskbedömning som ovan via formulär vid ankomst till mottagningen. Dessutom tas temperaturen.
- För akuta/inneliggande ställs screeningfrågorna till avdelningspersonal vid bokning. Be dem ta temperaturen.
- Anhöriga får inte följa med in på Endoskopienheten annat än i undantagsfall och i så fall ska de genomgå samma riskbedömning som patienten.
- Tolk som medföljer ska genomgå samma riskbedömning som patienten.
- Patienter som klassas som högrisk för Covid-19 eller med verifierad Covid-19 infektion får inte vistas i väntrum eller på uppvaket tillsammans med lågrisk patienter.

**Låg risk** - Inga symtom, ingen kontakt med Covid-19-smittad

**Hög risk** - Symtom eller kontakt med Covid-19-positiv senaste 2v

### Misstänkta smittvägar

Vårdhygien rekommenderar att vi som rutin skyddar oss bättre för stänk i ansiktet. Detta egentligen oavsett Covid-19. Därför rekommenderas skydd mot stänk i ansiktet även vid låg risk.

Vid undersökning av patienter med misstänkt eller bekräftad Covid-infektion skall skydd mot droppsmitta användas. Vid aerosolbildande procedurer tillägg av andningsskydd.

Man misstänker att endoskopi kan vara aerosolbildande vid Covid-19. Det bedöms föreligga större risk för aerosolsmitta vid övre endoskopi än nedre endoskopi.

Vid cystoskopi räcker skydd mot droppsmitta. Andningsskydd behövs inte.

### Skyddsåtgärder vid endoskopi

- **Låg risk**
  - Förutom sedvanliga hygienrutiner används plastförkläde (långärmat vid risk för stor mängd förorening av kroppsvätskor), handskar, heltäckande visir eller skyddsglasögon + munskydd IIR. Vid övre endoskopi alltid munskydd pga risk för stänk in under visir.
- **Hög risk/verifierade fall av Covid-19**
  - I första hand tas ställning till om endoskopin kan flyttas fram tills patienten är symptomfri.
  - I andra hand kan patienten provtas och skoperas om Covid-19 negativ. Kontakta infektionskliniken (coronatelefonen) för diskussion. Kan även gälla vid tveksamhet om patienten ska klassas som hög risk eller inte.
  - I tredje hand, i princip endast på vitalindikation, kan patienten skoperas ändå.
  - IVA-vårdade patienter endoskoperas på IVA.
  - Endast nödvändig personal medverkar vid endoskopin.
  - Om endoskopi behöver ske på Endoskopienheten (Växjö) skall den utföras på Endoskopisal 5 där det finns bäst ventilation. Ytdesinfektion av all utrustning och bänkar efteråt och låt rummet ventileras 1 h innan nästa patient tas in.
  - Förutom sedvanliga hygienrutiner använd utökat skydd med långärmat engångsrock/plastförkläde, FFP2/3 andningsskydd,

Giltig fr.o.m: 2020-04-17

Giltig t.o.m: 2023-04-17

Identifierare: 179437

Rutin gällande endoskoptisk verksamhet under Covid-19 pandemin



visir/skyddsglasögon, handskar som går upp över mudden på rocken.

Störst risk för smitta föreligger vid avtagande av personlig skyddsutrustning, det är viktigt att det görs på korrekt sätt. Se länk.

[http://www.regionkronoberg.se/contentassets/0da6072cafa34dd6ae9b264d0602ebc5/corona\\_skyddsklader\\_3.pdf](http://www.regionkronoberg.se/contentassets/0da6072cafa34dd6ae9b264d0602ebc5/corona_skyddsklader_3.pdf)

**Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare**