

Användning av syrgaskoncentrator hos Covid-19 patient

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Region Kronoberg

Regionen har ett begränsat antal syrgaskoncentratorer som används för behandling av hypoxi hos patienter med olika sjukdomar.

Behandlingen kan förväntas bli användbar även i samband med hypoxi hos Covid-19 patienter. Detta är en begränsad resurs som måste prioriteras. Följande indikationer ska prioriteras.

Obligatoriskt kriterie

Det måste föreligga en bestående hypoxi, efter optimering av övrig behandling, som är symptomgivande.

Indikationer:

- Patient som förväntas tillfriskna från infektionen och där hypoxibehandlingen kan möjliggöra att hen kan fortsätta vårdas utanför sjukhus.
- Möjliggöra tidigare utskrivning från sjukhusvård.
- Kraftigt symptomgivande hypoxi hos patient i livets slutskede där palliativ behandling enligt riktlinjer inte varit tillräckligt för att ge god palliativ vård. Morfin är förstahandspreparatet vid upplevd andnöd. Se särskild riktlinje.

Rutin

Remiss ställs till Lung- och allergimottagningen Växjö. Inkommande remisser bevakas och bedöms varje vardag. Vid beslut om behandling med syrgaskoncentrator beaktas aktuella riktlinjer för syrgasbehandling i hemmet.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.