

Analfistel

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Lennart Löf överläkare, Ulla Svanström narkossköterska kirurgsektionen, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

1	Ingrepp.....	2
2	Indikation	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient:.....	2
3.2	Anestesi:.....	2
3.3	Operation:.....	2
4	Position.....	2
5	Utrustning.....	3
6	Hygien.....	3
7	Elimination.....	3
8	Anestesi.....	3
8.1	Utförande:.....	3
9	Läkemedel övriga	3
10	Steril utrustning	3
11	Preparathantering.....	3
12	Peroperativ vård	3
13	Särskilda observanda.....	3
13.1	Anestesigång:.....	3
13.2	Operationsgång.....	3
14	Postop	4
14.1	Nutrition	4
14.1	Läkemedel.....	4
14.2	Hud.....	4
14.3	Patientinformation	4

1 Ingrepp

Analfistel

2 Indikation

Smärta, fistlar och/eller infektion.

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation.

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering till barn anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning](#)
- [Noggrann trycksårsprofylax](#)
- [Antibiotikaprofylax](#)
- Laxering i hemmet enligt ordination.

3.2 Anestesi:

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- **Blodgruppering: Ja**
- **Bastest: Nej**

3.3 Operation:

4 Position

Se bilder:

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\PLATINA\Kirurgsektionen\Uppläggningsbilder
Kirurgsektionen

- Bar hud mot operationsbordet.
- Ryggläge med båda armarna på armbord.
- Standardbord med delade benplattor.
- Patienten placeras med perineum vid utskälningen före nedsövning.
- Låt patienten prova ut benstöden före nedsövning.

- Benpåsar.

5 Utrustning

- Diatermi
- Analbyrån
- Baerhugger

6 Hygien

- Mössa– hjälmmodellen.
- [Arbetsklädsel](#)- lokala anvisningar.
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning – Vårdhandboken](#).

7 Elimination

- Bladderscan före anestesistart samt efter avslutad operation enligt riktlinjer.
Vid behov urintappning.
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation – vuxna patienter](#) – lokala anvisningar.

8 Anestesi

8.1 Utförande:

- Generell anestesi eller spinal.

9 Läkemedel övriga

- Marcain adrenalin 2,5 mg/ml eller Xylocain adrenalin 10 mg/ml.
- Fistelplugg (bara vid speciella operationer). Ligger i läkemedelsförrådet.
- Väteperoxid (eventuellt).
- Spongostan Anal (eventuellt).

10 Steril utrustning

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Nedre Gastro\
Instrumentlistor\Analfistel

11 Preparathantering

[Länk](#)

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken.

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång:

13.2 Operationsgång

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

14.1 Nutrition

Riklig dryck.

14.1 Läkemedel

Ge inte stolpiller.

14.2 Hud

Fistelplugg eller Seton. Ett Seton är en bit kirurgisk tråd som lämnas i fisteln i flera veckor för att hålla den öppen. Denna möjliggör dränering och underlättar läkning samtidigt som man undviker att skära i sfinktermuskulerna.

Ibland finns hudsår om man klyvt fisteln.

14.3 Patientinformation

Patientinformation operation av ändtarmen.

Samtal med operatör.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.