

Loop-ileostomi öppen

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Lennart Löf överläkare, Ulla Svanström narkossköterska kirurgsektionen, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

| | | |
|------|---------------------------------|---|
| 1 | Ingrepp | 2 |
| 2 | Indikation | 2 |
| 3 | Preoperativa förberedelser..... | 2 |
| 3.1 | Patient:..... | 2 |
| 3.2 | Anestesi:..... | 2 |
| 3.3 | Operation:..... | 2 |
| 4 | Position..... | 2 |
| 5 | Utrustning | 3 |
| 6 | Hygien..... | 3 |
| 7 | Elimination..... | 3 |
| 8 | Anestesi..... | 3 |
| 8.1 | Utförande:..... | 3 |
| 9 | Läkemedel övriga | 3 |
| 10 | Steril utrustning | 3 |
| 11 | Preparathantering..... | 3 |
| 12 | Peroperativ vård | 3 |
| 13 | Särskilda observanda..... | 3 |
| 13.1 | Anestesigång..... | 3 |
| 13.2 | Operationsgång..... | 4 |
| 14 | Postop | 4 |
| 14.1 | Övervakning..... | 4 |
| 14.2 | Andning | 4 |
| 14.3 | Nutrition | 4 |
| 14.4 | Elimination | 4 |
| 14.5 | Mobilisering..... | 4 |

1 Ingrepp

Loop-ileostomi öppen.

2 Indikation

Förändring i tarmen med behov av avlastande stomi.

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation.

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsduch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning](#)
- [Antibiotikaproylax](#)
- [Noggrann trycksårsprofylax](#)

3.2 Anestesi:

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- **Blodgruppering: Ja**
- **Bastest: Ja**

3.3 Operation:

-

4 Position

Se bilder:

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\PLATINA\Kirurgsektionen\Uppläggningsbilder
Kirurgsektionen

- Bar hud mot operationsbordet.
- Ryggläge med båda armarna på armbord.
- Kudde i knäveck samt hälskydd, rem för att fixera benen.
- Benpåsar och mössa.

5 Utrustning

- Diatermi
- Baerhugger
- Ranger vätskvevärmare
- Pannlampa.

6 Hygien

- Mössa- hjälmmodellen.
- [Arbetsklädsel](#)- lokala anvisningar.
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning – Vårdhandboken](#).

7 Elimination

- Eventuell urinkateter.
- Ventrikelsond oralt nr 18 som avlägsnas före väckning.

8 Anestesi

8.1 Utförande:

- Generell anestesi, intuberad och relaxerad patient.
- Eventuellt EDA.

9 Läkemedel övriga

- Marcain 2,5 mg/ml

10 Steril utrustning

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Nedre gastro\
Instrumentlistor\Loopileostomi

11 Preparathantering

[Länk](#)

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken.

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång

- Noggrann [trycksårsprofylax](#).
- [Antibiotikaprofylax](#)
- Minst 2 PVK.

13.2 Operationsgång

-

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

14.1 Övervakning

Provtagning dag 1: Blod- elstatus och CRP.

14.2 Andning

Andningsgymnastik.

14.3 Nutrition

Två näringsdrycker och för övrigt fri dryck när patienten är vaken och stabil om inte operatören ordinerat annat. Ska framgå i operationsberättelsen eller anestesijournalen.

14.4 Elimination

Urinkateter kan förekomma, observera urinproduktionen.
Observera stomins utseende avseende färg, svullnad och vätska.

14.5 Mobilisering

Påbörja mobilisering under operationsdagens kväll.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.