

Ablatio testis

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Lennart Löf överläkare, Ulla Svanström narkossköterska kirurgsektionen, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

| | | |
|------|----------------------------------|---|
| 1 | Ingrepp..... | 2 |
| 2 | Indikation | 2 |
| 3 | Preoperativa förberedelser..... | 2 |
| 3.1 | Patient:..... | 2 |
| 3.2 | Anestesi:..... | 2 |
| 3.3 | Operation:..... | 2 |
| 4 | Position..... | 3 |
| 5 | Utrustning..... | 3 |
| 6 | Hygien..... | 3 |
| 7 | Elimination..... | 3 |
| 8 | Anestesi..... | 3 |
| 8.1 | Utförande:..... | 3 |
| 9 | Läkemedel övriga | 3 |
| 10 | Steril utrustning | 3 |
| 11 | Preparathantering..... | 3 |
| 12 | Peroperativ vård | 4 |
| 13 | Särskilda observanda..... | 4 |
| 13.1 | Anestesigång:..... | 4 |
| 13.2 | Operationsgång..... | 4 |
| 14 | Postop | 4 |
| 14.1 | Övervakning..... | 4 |
| 14.1 | Hud..... | 4 |
| 14.2 | Postoperativa hjälpmedel | 4 |
| 14.3 | Information till patienten | 4 |

1 Ingrepp

Bortopererande av testiklar

2 Indikation

Vid prostatacancer för att minska tillväxten av cancerceller

Testikeltumör

Torsion med nekrotisk testikel

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient:

Förbereds enligt sedvanliga rutiner inför operation.

- Kontroll enligt WHO:s checklista för säker kirurgi
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering till barn anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- [Trombosprofylax](#)
- [Preoperativ blodprovstagning](#)
- [Antibiotikaproylax vid urologiska ingrepp](#)
- [Noggrann trycksårsprofylax](#)

3.2 Anestesi:

- Följ rutiner för att förebygga [perioperativ hypotermi](#).
- Kontrollera att alla läkemedel samt övrig utrustning finns förberett på salen. Undvik onödigt öppnande av dörrar peroperativt med avseende på kontaminationsrisken.
- **Blodgruppering: Nej**
- **Bastest: Nej**

3.3 Operation:

- Håravkortning.
- Kontrollera att all utrustning finns förberett på salen.
- Kontrollera att rätt instrument/implantat/engångsmaterial och läkemedel finns på salen.
- Se plocklista för ablatio testis och operationsanmälan i Cosmic.
- Kontrollera att de preoperativa hygienrutinerna enligt PM utförts avseende ventilation, personal på sal och uppdukning.

4 Position

Se bilder:

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\PLATINA\Kirurgsektionen\Uppläggningsbilder
Kirurgsektionen

- Ryggläge med båda armarna på armbord.
- Kudde i knäveckan samt hälskydd.

5 Utrustning

- Diatermi
- Baerhugger

T ex c-båge, benstöd, diatermi, baerhugger, Ranger vätskevärmare.

6 Hygien

- Mössa- hjälmmodellen.
- [Arbetsklädsel](#)- lokala anvisningar.
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning –](#) Vårdhandboken.

7 Elimination

- Bladderscan före anestesistart samt efter avslutad operation enligt riktlinjer. Patienten urintappas vid behov alternativt sätts urinkateter efter ordination av anestesiläkare.
- Övervakning av urinblåsa i samband med operation-vuxna patienter – lokala anvisningar

8 Anestesi

8.1 Utförande:

- Lokalanestesi, eventuellt med sedering
- Generell anestesi vid behov

9 Läkemedel övriga

- Eventuellt Xylocain 10 mg/ml
- Eventuellt Marcain 2,5 mg/ml

10 Steril utrustning

G:\Ane\Centralop\Omv_riktlinjer\Operation\Kirurgi\Urologi\
Instrumentlistor\Ablatio testis

11 Preparathantering

[Länk](#)

- Vid tumör skickas preparatet färskt till patologen.
- Vid testistorsion läggs preparatet i formalin och skickas till patologen.
- Vid prostatacancer skickas endast preparatet om makroskopiskt avvikande.

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#) – Vårdhandboken.

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång:

- 1 pvk

13.2 Operationsgång

- Håravkortning
- Tvätta skrotum med klorhexidinlösning.
- Om tumörmisstanke - tvätta även ljumskarna.
- Eventuellt tas px från den friska sidan.
- Vid sterildraperingen - noggrann förstärkning vid perineum.

14 Postop

[Generell Vårdplan Postop](#)

14.1 Övervakning

Observera blödning och svullnad.

14.1 Hud

Patienten kan duscha redan dagen efter operationen och i samband med detta avlägsna förbandet. Såren är sydda med suturer som är självabsorberande efter cirka 3 veckor.

14.2 Postoperativa hjälpmedel

Åtsittande kalsonger.

Eventuellt suspensoar enligt ordination, sätts på operation.

14.3 Information till patienten

Patientinformation ”Till dig som ska genomgå operation för att ta bort testiklarna”.

Eventuellt samtal med operatör.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.