

Blodförtunnande vid Covid 19 - vaccination

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Gunilla Östgaard chefläkare Primärvården

De vaccin som används mot Covid-19 ska alltid ges intramuskulärt. Vid behandling med blodförtunnande gäller därför

- Trombocythämmare: påverkar ej vaccinationen
- Warfarin: PK ska vara taget inom 2 veckor och ligga under 3,0.
- Dubbel- eller trippelbehandling med Warfarin och t ex ASA och /eller clopidogrel: PK ska vara kontrollerat senaste veckan och ligga under 2,0
- NOAK: Här finns en större diskrepans mellan riktlinjer men sannolikt är kompression viktigare än tidpunkt.

Rent praktiskt:

- Warfarin: Planera om möjligt in vaccination så att det finns ett aktuellt PK-värde. Går inte detta kan ett extra värde tas med AK-mottagningen som svars-mottagare. Ligger värdet över 3 tar patienten själv kontakt med AK-mottagningen för dosjustering och planering av tid för ny provtagning.
- Dubbel/trippelbehandling: patienten tar själv kontakt med AK-mottagningen som justerar doser och ger besked om vilken dag nytt prov ska tas och när vaccination kan ges.
- NOAK: ingen justering av doser behövs med var noga med kompression

Be patienten komprimera i 10 minuter medan de ändå väntar kvar efter vaccinationen.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare