

Covid-19-vaccination till allergiska patienter

Gäller för: Region Kronoberg

Grupp A

Lindriga allergiska besvär.

Vaccineras enligt rutin på vårdcentral eller annan vaccinationsmottagning.

Kvarstannar 15 min. Anafylaxiberedskap ska finnas.

Grupp B

De som haft svår allergisk reaktion mot födoämne, insektsstick, latex, kontrastmedel, lokalanestetika eller per orala läkemedel ska kvarstanna 30 minuter för observation. Förutom anafylaxiberedskap ska möjlighet att ge syrgas och sätta dropp finnas. Vaccination kan ske på vårdcentral där läkare ska finnas i tjänst. Med svår allergisk reaktion menas reaktion som krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

Grupp C

De som haft upprepade anafylaxier mot läkemedel, vaccin eller annat injicerat läkemedel remitteras till allergimottagning för individuell bedömning och eventuell vaccination sker på sjukhusmottagning.

Grupp D

Patienter med mastocytos eller hereditärt angioödem kräver individuell bedömning och eventuell vaccination sker på sjukhusmottagning. Remiss till allergimottagning.

Grupp E

Vid misstanke eller känd allergi mot polyetylenglykol (PEG, Makrogol) som finns i vaccin från Moderna och Pfizer eller polysorbat som finns i Astra Zenecas vaccin ska vaccination ej utföras. Risk för korsreaktioner.

Vid snabballergisk eller svår allergisk reaktion på dos ett ska dos två inte ges.

Remisskrav

Remiss är aktuell för patienter i grupp C och D. Av remissen ska framgå att:

1. Patienten önskar vaccination.
2. Beskrivning av de reaktioner patienten haft.
3. När det inträffade och tidsförlopp.
4. Vilka läkemedel eller andra substanser som misstänkes.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare