

Ytteröronplastik

Gäller för: Anestesikliniken

Utförs på: Operationsenheten Växjö

Faktaägare: Carina Rosell operationssjuksköterska, operationsenheten Växjö,
Björn Söderberg anestesijuksköterska, operationsenheten Växjö

Innehållsförteckning

1	Ingrepp	2
2	Indikation	2
3	Preoperativa förberedelser.....	2
3.1	Patient.....	2
3.2	Anestesi.....	2
3.3	Operation.....	2
4	Position.....	2
5	Utrustning	3
6	Hygien.....	3
7	Elimination.....	3
8	Anestesi.....	3
9	Läkemedel övriga	3
10	Steril utrustning	3
11	Preparathantering.....	3
12	Peroperativ vård.....	3
13	Särskilda observanda.....	3
13.1	Anestesigång.....	4
13.2	Operationsgång.....	4
14	Postop.....	4
15	Övervakning.....	4
15.1	Andning	4
15.2	Cirkulation	4
15.3	Nutrition	4
15.4	Elimination	4
15.5	Mobilisering.....	5
15.6	Smärta.....	5

15.7	Läkemedel.....	5
15.8	Postoperativa hjälpmedel	5
15.9	Information till patient	5

1 Ingrepp

Ytteröronplastik

2 Indikation

Utstående öron.

3 Preoperativa förberedelser

3.1 Patient

Operationen sker dagkirurgiskt.

- [WHO:s checklista](#)
- [Akuta operationer-rutiner och prioriteringar](#)
- [Preoperativa rutiner för slutenvårds- och dagkirurgiska patienter](#)
- [Preoperativa undersökningar inför operation på anestesikliniken](#)
- [Premedicinering av vuxna inför operation](#)
- [Premedicinering till barn anestesikliniken](#)
- [Preoperativ helkroppsdusch och hårkortning](#)
- [Preoperativa åtgärder för att undvika förväxlingar i samband med operativa ingrepp](#)
- Patienten ska om möjligt kissa före operation
- Samtal med operatör före operationen.

3.2 Anestesi

- [Barnanestesi Region Kronoberg](#)
- [Åtgärder för att undvika hypotermi](#)
- Blodgruppering: Nej
- Bastest: Nej

3.3 Operation

- Benremmar
- Ögonförband (typ ”Cornea-care”).

4 Position

- Rygläge
- Stor kudde under knäna

- Gelkuddar under hälarna
- OP bord med smal huvudplatta och blå gelkudde
- Sänkt huvudplatta under operationen
- Vänster arm ut och höger arm längs med kroppen.

5 Utrustning

- Ljuskälla
- Pannlampa
- Diatermi
- Sug

6 Hygien

- [Arbetsklädsel](#)
- [Personalföreskrifter för operationsavdelning](#)

7 Elimination

- Bladderscan före väckning om patienten är sövd.
- [Övervakning av urinblåsa i samband med operation - vuxna patienter](#)
- [Urinblåsekontroll perioperativt - barn](#)

8 Anestesi

Generell anestesi alternativt lokal anestesi

Val av anestesimetod beroende på patientens ålder, vilja samt operatörens önskemål

Armerad larynxmask utan knäkoppling

9 Läkemedel övriga

Enligt anestesibedömning.

10 Steril utrustning

Se instrumentlistor i pärm ”Öronoperationer” och på G-servern (vaxjo (G:) → Ane → Centralop → Omv_riktlinjer → operation → örons instrumentlistor)

11 Preparathantering

[Hantering av preparat och prover](#)

12 Peroperativ vård

[Peroperativ vård](#)

13 Särskilda observanda

13.1 Anestesigång

- PVK helst i vänster arm
- Vätska: Rehydrex alternativt Plasmalyte.

13.2 Operationsgång

- Ytterörat formas och sutureras i önskat läge, alternativt behöver öronbrosket slipas ner för att örat ska lägga sig bakåt mot huvudet.

Även om operationen utförs i narkos anlägger man lokalanestesimedel i örat och detta för att lyfta huden ifrån själva öronbrosket samt i blodstillande syfte.

Själva ingreppet börjar sedan på baksidan av öronbrosket där man gör en längsgående ovalär incision i huden. Denna ovalär drar man sedan bort. Man frilägger sedan brosket helt från huden. När man har brosket fritt använder man en sliptrissa och slipar på broskets framsida. Man bryter då av de elastiska fibreerna och öronbrosket kommer att vika sig bakåt.

När man fått ett bra resultat syr man samman huden bakom örat. Det hela avslutas sedan med att man lägger ett öronförband. Detta görs på båda öronen. Därefter sätts ett pannband som patienten har på sitt huvud cirka en vecka innan stygnen tages bort.

14 Postop

[Postoperativ riktlinje anestesikliniken Växjö](#)

15 Övervakning

15.1 Andning

Syrgas på grimma alternativt mask.

15.2 Cirkulation

Patienter under 18 år: Saturation (eventuell ytterligare övervakning ordineras av anestesiläkare).

Patienter över 18 år: Saturation, blodtryck och EKG (om patienten har varit sövd).

15.3 Nutrition

Patienten får börja dricka när han/hon är vaken.

15.4 Elimination

Patienten ska kissa innan hemgång.

Bladderscan.

15.5 Mobilisering

Fri.

15.6 Smärta

[Postoperativ riktlinje anestesikliniken Växjö](#)

15.7 Läkemedel

[Generell ordination av läkemedel till sjuksköterskor på postoperativa enheterna](#)

15.8 Postoperativa hjälpmedel

Inga.

15.9 Information till patient

Samtal med operatör.

Råd om smärtstillande läkemedel.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.