

# Influensa - vaccinationsindikationer och behandling

**Gäller för:** Region Kronoberg

## Vaccinationsindikationer

Vaccination utgör grunden när vi skall skydda riskpatienter.

Socialstyrelsen rekommenderar vaccination till:

1. personer över 65 års ålder
2. gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
3. personer med kroniska sjukdomar:
  - a) kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  - b) instabil diabetes mellitus
  - c) kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  - d) kronisk lever- eller njursvikt
  - e) astma (för barn- och ungdom gäller svår astma, grad 4, med funktionsnedsättning)
  - f) extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  - g) flerfunktionshinder hos barn.

## Behandling

Influensapatienter som inte bedöms vara tillräckligt skyddade mot allvarlig sjukdom genom vaccination bör erbjudas antiviral behandling om de tillhör en riskgrupp enligt ovan eller är allvarligt sjuka. För friska gravida rekommenderas behandling under andra och tredje trimestern.

## Tänk på:

1. Patienten skall tas direkt in på ett undersökningsrum.
2. Patienten skall inte själv hämta ut sitt recept på apoteket.

## Vårdhygieniska rutiner

Se länk till lokala vårdhygieniska rutiner.

## Mer information

Läs mer i Folkhälsomyndighetens "Rekommendationer för profylax och behandling av influensa".

Giltig fr.o.m: 2017-06-01

Giltig t.o.m: 2020-03-31

Identifierare: 33408

Influensa - vaccinationsindikationer och behandling



## Relaterade dokument

### Interna länkar

[Vårdhygieniska rutiner vid influensa](#)

### Externa länkar

[Folkhälsomyndighetens rekommendationer för profylax och behandling av influensa](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.