

Konjunktivit hos barn

Gäller för: Region Kronoberg

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	2
1.1	Definition.....	2
1.2	Etiologi.....	2
1.3	Naturalförlopp	2
2	Symtom.....	2
3	Utredning.....	2
3.1	Diagnostik.....	2
4	Behandling.....	2
4.1	Egenvård.....	2
4.2	Antibiotika	2
5	Remiss.....	2
6	Relaterade dokument.....	2
6.1	Interna länkar	2
6.2	Externa länkar	3

1 Inledning

1.1 Definition

Inflammation av konjunktiva orsakad av virus eller bakterier.

1.2 Etiologi

Efter neonatalperioden finner man etiologisk genes i ca 70% av fallen. Av dessa är 55-75% orsakade av bakterier och ca 20% av kända virus. Bland bakterierna är *Haemofilus influenzae* vanligast följt av *Streptococcus pneumoniae* och *Moraxella catharralis*.

1.3 Naturalförlopp

Ögoninflammation är oftast självläkande och >80% är symtomfria efter en vecka.

2 Symtom

Rodnad i konjunktiva, skavkänsla och klar eller varig sekretion. Det finns ingen evidens för att man utifrån kliniska symtom kan skilja mellan en bakteriell och en virusutlöst konjunktivit hos barn.

3 Utredning

3.1 Diagnostik

En bedömning av inflammationens svårighetsgrad bör göras samt om påverkan på välbefinnandet finns. I normalfallet behövs ingen ytterligare provtagning.

4 Behandling

4.1 Egenvård

Viktigaste behandlingen är mekanisk rengöring med ljummet vatten. Torka med mjukt papper. Om textilhandduk används ska denna inte användas av andra och den bör tvättas varje dag. Var noga med handhygien.

4.2 Antibiotika

Vid utebliven bättring av egenvård efter 5-7 dagar kan antibiotika övervägas. Förstahandsvalet är Chloromycetin® alternativt Fucithalmic®.

5 Remiss

Remittera om

- Terapisvikt – utebliven effekt på en veckas behandling
- Misstanke om corneala skador

6 Relaterade dokument

6.1 Interna länkar

[Rekommenderade läkemedel Kronoberg](#)

6.2 Externa länkar

[Luftvägsinfektioner hos förskolebarn](#)

[Smitta i förskolan - en kunskapsöversikt](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.