

Vaccinationer vid splenektomi

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Arne Runehagen, överläkare, infektionskliniken Växjö

Vaccination av patient utan fungerande mjälte

Personer som fått sin mjälte bortopererad löper en ökad risk att insjukna med svåra infektioner orsakade av kapselförsedda bakterier. Ungefär 5 % kommer drabbas av en sådan infektion under resten av livet. Den läkare som handhar mjältextiperade patienter är välkommen att remittera patienten till infektionsmottagningen för vaccination om man inte själv vill stå för vaccinationerna.

Aktuella agens är:

- **Pneumokocker**

Om möjligt ges Prevenar[®] minst två veckor innan mjälten tas bort. Vid akut splenektomi bör man vänta med vaccination tills det har gått minst 2 veckor. En dos (0,5 ml) av Prevenar13 (PCV13) ges intramuskulärt följt av en dos polysackaridvaccin Pneumovax (PPV23) tidigast efter åtta veckor. PPV23 upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen med PPV23. Är personen sedan tidigare pneumokockvaccinerad med Pneumovax skall det gå ett år efter Pneumovaxdosen innan man ger Prevenar 13.

- **Meningokocker**

Även meningokockvaccin kan övervägas även om det vetenskapliga stödet är svagt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ger:

1. Menveo[®], konjugerat vaccin mot A,C,W-135,Y, en dos 0,5 ml im vid två tillfällen med 2 månaders intervall
2. Bexsero[®], vaccin mot grupp B, en dos 0,5 ml im vid två tillfällen med 2 månaders intervall.

För närvarande rekommenderas inte senare boosterdos.

- **Haemophilus influenzae**

Dokumenterad indikation finns för barn men inte för vuxna. Vill man ändå ge vaccinet räcker en dos (för alla över 2 år), vilket beräknas ge livslångt skydd.

Dokumentation och information till patienten

Vaccinationerna ordinerar i Cosmic. Skriv även gärna ned genomgångna vaccinationer (t. ex. i gula vaccinationsboken) och ge till patienten. Informera om att patienten själv ska kontakta infektionsmottagningen efter 5 år för besked om eventuellt behov av kompletterande vaccinationer.

Relaterade dokument

Externa länkar

[Vårdprogram splenektomi hos barn](#)

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.